

IDOQUINOL

Autre NOM : Diodoquin®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'iodoquinol est un médicament utilisé pour traiter les infections causées par des parasites (amibes). Il peut également être administré pour traiter la diarrhée due à *Entamoeba histolytica* ou *Giardia lamblia*.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'iodoquinol est présenté en comprimés à 210 et à 650 mg. La dose habituelle est de 650 mg trois fois par jour pendant 20 jours.

Chaque dose d'iodoquinol doit être prise avec un repas.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 210 mg

comprimé à 650 mg

___comprimés(s) (___mg) ___ fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'iodoquinol, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre vos doses d'iodoquinol, l'infection persistera et pourrait s'aggraver. Par conséquent, il est extrêmement important de prendre vos doses d'iodoquinol pour toute la durée du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les effets indésirables parfois observés avec l'iodoquinol sont : **nausées, vomissements, diarrhée, crampes abdominales et démangeaisons. De la fièvre, des frissons, des maux de tête, des étourdissements et une augmentation du volume de la thyroïde** ont également été rapportés. Si ces effets indésirables se manifestent et sont incommodants, vous devriez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Certaines personnes peuvent présenter des **troubles de la vision**. De plus, une **sensation de picotement ou d'engourdissement** au niveau des mains, jambes et pieds peut survenir (neuropathie périphérique). Si vous présentez ces symptômes, veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien.

Dans de rares cas, une **réaction allergique** accompagnée d'une rougeur (éruption) sur la peau, d'urticaire ou d'éruptions semblables à l'acné peut survenir. Le cas échéant, communiquez immédiatement avec un médecin.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de

vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre de l'iodoquinol, veuillez aviser votre médecin si vous avez des problèmes de thyroïde, de foie ou de vision. Avisez également votre médecin si vous êtes allergique à l'iode. Vous ne devriez PAS prendre d'iodoquinol si vous êtes allergique à des préparations renfermant de l'iode (y compris les crevettes).

Veuillez mentionner à votre médecin et pharmacien tous les médicaments disponibles prescrits ou non que vous prenez. Vous devriez également mentionner tous les produits naturels que vous prenez. Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou produit naturel, vous devriez consulter votre pharmacien.

La sécurité de l'iodoquinol pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Veuillez en discuter avec votre médecin si cela vous préoccupe.

Si vous avez de la diarrhée, il est très important de boire beaucoup de liquide afin d'éviter la déshydratation. Si vous présentez une diarrhée légère (vous allez à la selle moins de 4 fois par jour), la consommation de boissons gazeuses sans caféine, de jus ou de boissons réhydratantes pourrait suffire. Si la diarrhée est plus grave, des boissons réhydratantes

spécialement formulées devraient être consommées.

Ces boissons (par exemple, Pedialyte® ou Gastrolyte®) sont disponibles en pharmacie. Ces boissons contiennent du sucre et d'autres substances (sodium, potassium) que vous pourriez éliminer en grandes quantités si vous avez de la diarrhée. Votre pharmacien peut recommander la quantité de boissons à consommer pour éviter la déshydratation.

Vous devriez consulter un médecin si vous présentez des symptômes de déshydratation, c'est-à-dire sécheresse de la bouche, soif excessive, peau plissée, peu ou pas d'urine, étourdissements et sensation de tête légère.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés d'iodoquinol doivent être entreposés dans un endroit frais (15 à 30 °C) et sec, à l'abri de la lumière, et hors de la portée des enfants. Assurez-vous que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) indiquée sur l'emballage.

Ne pas entreposer le médicament dans la salle de bains ni la cuisine étant donné que la chaleur et l'humidité peuvent affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à

votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

Référence : Monographie de Diodoquin® (iodoquinol); Oakville, Ont., Canada : Glenwood Laboratories Canada Ltd., 2002. Préparé par le *Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group*, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site www.hivclinic.ca

IODOQUINOL

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***