

ISONIAZIDE

Autres NOMS : INH, Isotamine®, PMS-Isoniazid, Rifater® (renferme une association fixe d'isoniazide, de rifampine et de pyrazinamide)

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'isoniazide est un antibactérien qui élimine les bactéries causant la tuberculose. Cet agent est habituellement utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter la tuberculose, et peut être administré seul pour prévenir l'apparition de tuberculose chez les personnes ayant été en contact avec les bactéries de la tuberculose.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'isoniazide est présenté sous forme de comprimés blancs à 50, 100 ou 300 mg. Cet agent est également disponible sous forme de sirop à 10 mg/mL. Ce médicament est habituellement pris une fois par jour. La dose recommandée est fonction du poids.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 50 mg
- comprimé à 100 mg
- comprimé à 300 mg

___ comprimé(s) (___ mg) ___ fois par jour

ou

- sirop à 10 mg/mL

___ mL (___ mg) ___ fois par jour

L'isoniazide est plus efficace s'il est administré à jeun (une heure avant ou deux heures après un repas). Si vous prenez des antiacides renfermant un gel d'hydroxyde d'aluminium (Amphojel®, Maabx®), ces agents devraient

être pris au moins 1 heure après l'administration de la dose d'isoniazide.

Chez les patients ayant des problèmes à absorber la présentation orale d'isoniazide, la préparation par voie intraveineuse peut être utilisée. La préparation par voie intraveineuse est une drogue expérimentale au Canada.

Pour être efficace, l'isoniazide doit être pris régulièrement. Il est important de prendre toutes les doses, et ce, même si vous vous sentez mieux. Pour ne pas oublier de prendre les doses, essayez de prendre le médicament en même temps que vous effectuez une autre activité quotidienne routinière, telle que vous brosser les dents au coucher.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'isoniazide, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'isoniazide peut parfois causer des **nausées, des vomissements ou une perte d'appétit**. Même s'il est préférable de prendre l'isoniazide à jeun, il est possible de soulager les effets d'estomac indésirables en le prenant avec une collation. Si ces effets restent incommodants, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

L'isoniazide peut causer **une sensation de picotement, de chatouillement, de brûlure ou d'engourdissement dans les mains et les pieds**. Communiquez avec votre médecin si vous avez ces symptômes. Celui-ci pourrait vous prescrire de la pyridoxine (vitamine B₆) pour traiter ou prévenir ce problème.

L'isoniazide peut **augmenter les enzymes du foie**, et ce, sans symptômes évidents. De rares cas d'**hépatite** (inflammation du foie) peuvent survenir. Les signes d'hépatite comprennent des yeux et une peau jaunes, une urine foncée, de la fièvre, des nausées et/ou des vomissements, des selles pâles, une fatigue et une douleur abdominale. Avisez votre médecin si vous avez ces symptômes. Votre médecin effectuera des tests sanguins régulièrement pour vérifier votre sang ainsi que le niveau d'enzymes de votre foie.

De rares cas de **réaction allergique** avec symptômes tels que **rougeur (éruption) sur la peau, fièvre, frissons, douleurs aux articulations et enflure des ganglions** peuvent survenir. Le cas échéant, cessez de prendre l'isoniazide et communiquez **immédiatement** avec votre médecin.

De rares cas de **problèmes de vision ou de douleur aux yeux** ont été observés avec l'isoniazide. Consultez votre médecin si ces effets surviennent.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de prendre l'isoniazide, avisez votre médecin si vous avez déjà été traité pour la tuberculose, si vous avez déjà pris ce médicament et avez eu des effets indésirables. Avisez aussi votre médecin si vous avez des antécédents de maladie des reins ou du foie, de diabète ou d'alcoolisme. Certains médicaments peuvent intensifier ou diminuer l'effet de l'isoniazide. De plus, l'isoniazide peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non, en particulier **des antiacides à base de gel**

d'hydroxyde d'aluminium (Amphogel®), Maalox®), le disulfiram (Antabuse®), la phénytoïne (Dilantin®), et la carbamazépine (Tegretol®). Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Les diabétiques ne devraient pas utiliser le Clinitest pour vérifier le taux de sucre dans l'urine car l'isoniazide peut fausser les résultats de ce test. Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes enceinte ou allaitez.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés d'isoniazide doivent être gardés dans un endroit frais (15-25 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Isotamine® (isoniazide). Montréal, Qc, Canada : ICN Canada Ltd., 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

ISONIAZIDE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***