

ITRACONAZOLE

Autre NOM : Sporanox®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'itraconazole est un antifongique utilisé pour traiter les infections à champignons de la bouche (muguet), de l'œsophage, de l'appareil génital (infection à levures) et d'autres régions. Il peut aussi être utilisé pour prévenir la récurrence de méningite à *Cryptococcus* (infection du cerveau) ou la récurrence d'autres types d'infections à champignons.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'itraconazole est offert sous forme de capsules à 100 mg et d'une suspension orale à 10 mg/mL.

La dose d'itraconazole administrée est fonction du type d'infection traitée. La dose habituelle est d'une ou deux fois par jour.

Les **capsules** d'itraconazole devraient être prises immédiatement après un repas. La **solution orale** d'itraconazole ne devrait pas être prise avec de la nourriture. Évitez de prendre un antiacide (Maalox®, Tums®, etc.) ou la didanosine (Videx^{MC}) en même temps que les **capsules** d'itraconazole, puisqu'un milieu acide dans l'estomac est nécessaire à l'absorption adéquate de l'itraconazole. Si vous devez prendre des antiacides ou la didanosine (Videx^{MC}), veuillez les prendre au moins 1 heure avant ou 2 heures après la prise des capsules d'itraconazole. Si vous prenez des anti-ulcéreux qui peuvent diminuer l'acidité de l'estomac

[ranitidine (Zantac®), famotidine (Pepcid®), pantoprazole (Pantoloc^{MC}), lansoprazole (Prevacid®), oméprazole (Losec®), rabéprazole (Pariet®), ésoméprazole (Nexium^{MC})], l'absorption de l'itraconazole pourrait être améliorée en prenant les capsules d'itraconazole avec une boisson gazeuse brune ou du jus de canneberge.

Votre dose est la suivante :

capsule à 100 mg

_____capsule(s) (_____mg) _____fois par jour

ou

solution orale à 10 mg / mL

_____mL (_____mg) _____fois par jour

Se rincer la bouche et avaler

Prendre l'itraconazole pour toute la durée prescrite. Si vous cessez de le prendre avant, votre infection pourrait revenir. Consultez votre médecin si l'infection s'aggrave ou persiste.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'itraconazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables ?

Des nausées, des vomissements, une diarrhée, des maux de tête et des étourdissements sont fréquents et devraient disparaître à mesure que votre organisme s'ajuste au médicament. Si ces effets deviennent incommodants, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

L'itraconazole peut causer **une augmentation des résultats de divers tests visant à mesurer la fonction du foie**. Ces changements indiquent qu'il faut vérifier la présence de lésions au foie. Si vous ressentez **une fatigue inhabituelle, avec les yeux et la peau jaunes, des nausées, des vomissements, une urine foncée ou des selles pâles**, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

L'itraconazole peut causer une baisse de **potassium** dans votre corps, ce qui peut causer **une fatigue inhabituelle ou une faiblesse dans les jambes et bras**. Si vous avez ces symptômes, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Une réaction allergique à l'itraconazole est possible, mais rare. Les symptômes d'une réaction allergique comprennent : **fièvre, rougeurs (éruptions) sur la peau ou démangeaisons**. Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez ces symptômes.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Certains médicaments peuvent intensifier ou diminuer l'effet de l'itraconazole. De plus, l'itraconazole peut influencer l'effet de

certains médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Vous ne devriez PAS prendre les médicaments suivants si vous prenez de l'itraconazole :

- Astémizole (Hismanal®)
- Cisapride (Prepulsid®)
- Lovastatine (Mevacor®)
- Midazolam (Versed®)
- Pimozide (Orap®)
- Quinidine (Biquin Durules®)
- Terfénadine (Seldane®)
- Simvastatine (Zocor®)
- Triazolam (Halcion®)

Les femmes en âge de procréer ne devraient prendre l'itraconazole QUE si elles utilisent une méthode efficace de contrôle des naissances (condom, pilule contraceptive).

L'itraconazole ne devrait pas être utilisé par les femmes enceintes. L'allaitement n'est PAS recommandé pendant que vous prenez ce médicament. Veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les capsules d'itraconazole et la solution orale devraient être entreposées dans un endroit sec et frais (15-25°C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Sporanox® (itraconazole). North York, On, Canada : Jansenn-Ortho Inc, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuilles de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

ITRACONAZOLE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***