

KÉTOCONAZOLE

Autre NOM : Nizoral®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le kétoconazole est un antifongique utilisé pour traiter les infections à champignons de la bouche (muguet), de l'œsophage, de l'appareil génital (infection à levures) et d'autres régions. Il peut aussi être utilisé pour prévenir une rechute après le traitement de l'infection initiale.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le kétoconazole est offert sous forme de comprimés à 200 mg et d'une suspension orale à 20 mg/mL.

La dose de kétoconazole administrée est fonction du type d'infection traitée. La dose habituelle est d'une fois par jour.

Le kétoconazole devrait être pris avec un repas. Évitez de prendre un antiacide (Maalox®, Tums®, etc.) ou la didanosine (Videx^{MC}) en même temps que le kétoconazole, puisqu'un milieu acide dans l'estomac est nécessaire à l'absorption adéquate du kétoconazole. Si vous devez prendre des antiacides ou la didanosine (Videx^{MC}), veuillez les prendre au moins 1 heure avant ou 2 heures après la prise du kétoconazole.

Si vous prenez des anti-ulcéreux qui peuvent diminuer l'acidité de l'estomac [ranitidine (Zantac®), famotidine (Pepcid®), pantoprazole (Pantoloc^{MC}), lansoprazole (Prevacid®), oméprazole (Losec®),

rabéprazole (Pariet®), ésoméprazole (Nexium^{MC})], leur absorption pourrait être améliorée en prenant le kétoconazole avec une boisson gazeuse brune ou du jus de canneberge.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 200 mg

____comprimé(s) (____mg) ____fois par jour

ou

suspension orale à 20 mg / mL

____mL (____mg) ____ fois par jour

Agiter le flacon avant chaque emploi

Prendre le kétoconazole pour toute la durée prescrite. Si vous cessez de le prendre avant, votre infection pourrait revenir. Consultez votre médecin si l'infection s'aggrave ou persiste.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de kétoconazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les effets indésirables peuvent comprendre : **nausées, douleurs abdominales et démangeaisons.** D'autres effets secondaires moins courants comprennent : **maux de tête,**

étourdissements, somnolence, fièvre, rougeurs (éruptions) sur la peau, diarrhée ou impuissance. Si vos yeux deviennent sensibles à la lumière, considérez le port de verres fumés. Une **douleur ou une sensibilité** des seins peut survenir chez les hommes. Si ces effets deviennent incommodants, consultez votre médecin ou votre pharmacien ou discutez-en lors de votre prochain rendez-vous.

Le kétoconazole peut **augmenter les enzymes du foie**, et ce, sans symptômes évidents. De rares cas d'**hépatite** (inflammation du foie) peuvent survenir. Les signes d'hépatite comprennent des yeux et une peau jaunes, une urine foncée, de la fièvre, des nausées et/ou des vomissements, des selles pâles, une fatigue et une douleur abdominale. Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez ces symptômes.

D'autres effets indésirables rares peuvent comprendre une **diminution du nombre de globules blancs** (servant à combattre les infections) et une **diminution du nombre de plaquettes** (nécessaires à la coagulation du sang). Avisez votre médecin si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, saignements ou bleus.

Votre médecin effectuera des tests sanguins régulièrement pour vérifier la fonction de votre foie et de vos surrénales, ainsi que le nombre de globules blancs et de plaquettes.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Certains médicaments peuvent intensifier ou diminuer l'effet du kétoconazole. De plus, le kétoconazole peut influencer l'effet de certains médicaments que vous prenez. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Vous ne devriez PAS prendre les médicaments suivants si vous prenez du kétoconazole :

- Astémizole (Hismanal®)
- Cisapride (Prepulsid®)
- Lovastatine (Mevacor®)
- Midazolam (Versed®)
- Pimozide (Orap®)
- Quinidine (Biquin Durules®)
- Terfénadine (Seldane®)
- Simvastatine (Zocor®)
- Triazolam (Halcion®)

Les femmes en âge de procréer ne devraient prendre le kétoconazole QUE si elles utilisent une méthode efficace de contrôle des naissances (condom, pilule contraceptive).

Le kétoconazole ne devrait pas être utilisé par les femmes enceintes. L'allaitement n'est PAS recommandé pendant que vous prenez ce médicament. Veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le kétoconazole devrait être entreposé dans un endroit sec et frais (15-30°C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Nizoral® (kétoconazole). North York, On, Canada : Jansenn-Ortho Inc, 1998. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

KÉTOCONAZOLE

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS