

MÉTRONIDAZOLE

Autre NOM : Flagyl®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le métronidazole est un médicament utilisé pour traiter les infections causées par des parasites (amibes) et des bactéries anaérobies. Il peut également être administré pour traiter la diarrhée due à *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* ou *Clostridium difficile*. Le métronidazole peut être utilisé pour traiter les infections vaginales ou divers types d'infections bactériennes.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le métronidazole est offert sous forme de comprimés à 250 mg et de capsules à 500 mg, de crèmes et suppositoires vaginaux et d'une crème pouvant être appliquée sur la peau. Au besoin, le métronidazole peut être administré par voie intraveineuse (dans les veines). La dose recommandée de métronidazole variera en fonction du type d'infection traitée. Le métronidazole peut être pris avec ou sans nourriture. **Vous ne devriez PAS consommer d'alcool pendant votre traitement et pendant au moins 24 heures après la fin du traitement.**

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 250 mg
- capsule à 500 mg

___comprimés ou capsules (___mg) par la bouche ___fois par jour pendant _____ jours

ou

- suppositoire vaginal à 500 mg
- crème vaginale (applicateur fourni)

___suppositoire / contenu d'applicateur
___fois par jour pendant ___jours

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de métronidazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre vos doses de métronidazole, l'infection persistera et pourrait s'aggraver. Par conséquent, il est extrêmement important de prendre vos doses de métronidazole pour toute la durée du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les effets indésirables parfois observés avec le métronidazole sont : **nausées, vomissements, malaise d'estomac, perte d'appétit, sécheresse de la bouche, goût métallique.** Le métronidazole peut aussi causer : **maux de tête, étourdissements, somnolence, confusion.** Ce médicament peut rarement causer des **hallucinations, des convulsions et une sensation de picotement ou d'engourdissement dans les mains, les jambes et les pieds** (neuropathie périphérique). Si ces effets surviennent et sont incommodants, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Dans de rares cas, une **réaction allergique** accompagnée d'une rougeur (éruption) sur la peau, d'urticaire ou de fièvre peut survenir. Le cas échéant, communiquez immédiatement avec un médecin.

Le métronidazole peut causer une **diminution du nombre de globules blancs** (servant à combattre les infections) ainsi qu'une

augmentation des enzymes du foie (signe de dommage au foie). Des tests sanguins devraient être effectués régulièrement pour vérifier s'il y a des changements dans ces valeurs. Votre médecin vérifiera aussi la fonction de votre pancréas. Avisez votre médecin si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, mal de gorge, fatigue, peau et yeux jaunes, douleur abdominale intense et vomissements.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre le métronidazole, veuillez aviser votre médecin si vous avez des problèmes de foie, de sang ou du système nerveux (convulsions). Avisez également votre médecin si vous êtes allergique au métronidazole. Vous ne devriez PAS prendre du métronidazole si vous êtes allergique à ce médicament.

Vous ne devriez PAS consommer d'alcool pendant que vous prenez du métronidazole et pendant au moins 24 heures après la fin du traitement, car l'alcool pourrait causer des bouffées de chaleur, une rougeur au visage et à la poitrine, des nausées, des maux de tête et une sensation générale de malaise.

Étant donné que ce médicament peut causer des étourdissements, une somnolence ou une perte de la vigilance, vous ne devriez PAS conduire, utiliser de la machinerie lourde ni faire toute activité qui pourrait

être dangereuse en cas d'étourdissement ou de perte de vigilance.

Le métronidazole peut entraver l'effet d'autres médicaments. Veuillez mentionner à votre médecin et votre pharmacien tous les médicaments disponibles prescrits ou non que vous prenez. Vous devriez également mentionner tous les produits naturels que vous prenez. Avant de commencer à prendre un nouveau médicament ou produit naturel, vous devriez consulter votre pharmacien.

Tout particulièrement, vous ne devriez PAS prendre le métronidazole si vous prenez du disulfiram (Antabuse®). Avisez aussi votre médecin et votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants :

- 5-fluorouracil
- lithium (Carbolith^{MC}, Lithane^{MC}, Duralith®)
- phénobarbital
- phénytoïne (Dilantin^{MC})
- warfarine (Coumadin®)

Le métronidazole ne devrait PAS être utilisé durant la grossesse, surtout durant le premier trimestre. Avisez votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin devra décider si les bienfaits possibles du médicament l'emportent sur les risques pour l'enfant à naître. Vous ne devriez PAS allaiter si vous prenez du métronidazole.

Si vous avez de la diarrhée, il est essentiel de boire des quantités suffisantes de liquide pour éviter la déshydratation. Si votre diarrhée est légère (moins de 4 selles par jour), boire des boissons gazeuses sans caféine, du jus ou des boissons réhydratantes peut être suffisant. Si la diarrhée est plus grave, des boissons réhydratantes spéciales peuvent être indiquées. On peut se procurer ces produits en pharmacie (Pedialyte® ou Gastrolyte®). Ces boissons contiennent du sucre et d'autres substances que vous risquez de perdre en raison de la diarrhée (sodium, potassium). Votre pharmacien vous

indiquera la quantité de ces boissons à prendre pour éviter la déshydratation.

Vous devriez consulter un médecin si vous avez un ou plusieurs symptômes associés à la déshydratation, dont une sécheresse de la bouche, une soif excessive, la peau plissée, peu ou pas d'urine, des étourdissements et une sensation de tête légère.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le métronidazole devrait être gardé dans un endroit sec et frais (15-25 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Flagyl® (métronidazole); Laval, Qc, Canada : Aventis Pharma, 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

MÉTRONIDAZOLE

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS