

ELVITÉGRAVIR/ COBICISTAT/ TÉNOFOVIR/ EMTRICITABINE

Autres NOMS: Stribild®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Stribild® est un antirétroviral (anti-VIH) composé de : elvitégravir, emtricitabine (*Emtriva*), ténofovir (*Viread*) et cobicistat. L'elvitégravir est un inhibiteur de l'intégrase, l'emtricitabine et le ténofovir sont des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) et le cobicistat est un agent potentialisant. Le Stribild® est un traitement complet qui contient 3 ingrédients actifs et un agent potentialisant en un seul comprimé, et il peut être utilisé seul pour retarder la progression du VIH. Ce médicament devrait diminuer le nombre de virus dans le sang (charge virale), permettant donc au corps de produire plus de cellules immunitaires (CD4+). Vous serez mieux protégé contre les infections opportunistes qui se produisent quand le système immunitaire est faible.

Le Stribild® ne guérit pas le VIH et ne tue pas complètement le virus du VIH, mais il aide à prévenir des dommages futurs au corps en ralentissant la production de nouveaux virus. Vous serez toujours à risque de transmettre le VIH par partage d'aiguilles, contacts sexuels ou contact sanguin. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires pour éviter de transmettre le VIH aux autres.

COMMENT prendre ce médicament?

La dose adulte habituelle de Stribild® est de 1 comprimé une fois par jour en mangeant. Le Stribild® devrait être pris à la même heure chaque jour.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous manquez une dose de Stribild® et le réalisez moins de 12 heures après, prenez le comprimé dès que possible. Toutefois, si plus de 12 heures se sont écoulées, ne doublez pas la dose : sautez la dose oubliée et prenez votre prochain comprimé à l'heure habituelle.

Pourquoi ne devriez-vous pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous manquez des doses de Stribild®, le nombre de virus dans votre sang (charge virale) recommencera à augmenter et votre système immunitaire s'affaiblira. Quelques doses manquées peuvent être suffisantes pour que l'efficacité du Stribild® diminue, un phénomène appelé **résistance**. Quand ceci se produit, l'efficacité d'autres antirétroviraux qui agissent de la même façon que le Stribild® peut aussi diminuer. Par conséquent, **manquer des doses de Stribild® diminue les options de traitement pour le futur**. Veuillez ne pas cesser le Stribild® ou changer votre dose sans en parler à votre médecin en premier.

Quels sont les EFFETS SECONDAIRES de ce médicament? Que devriez-vous faire?

Certaines personnes prenant Stribild® peuvent avoir de la diarrhée, de la nausée ou des maux de tête. D'autres effets secondaires possibles incluent: dépression, vomissements, fatigue, douleur abdominale, inconfort à l'estomac, gaz, étourdissement, troubles du sommeil, rêves anormaux, problèmes rénaux graves et éruptions cutanées. Votre médecin

ou votre pharmacien peut recommander des méthodes pour diminuer ces effets secondaires.

Il est important de vous rendre à vos rendez-vous médicaux et à vos tests sanguins pour que votre progression soit suivie.

Quelles sont les autres PRÉCAUTIONS à prendre lors de la prise du médicament?

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du Stribild®. De plus, le Stribild® peut influencer l'effet de certains médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tout médicament prescrit et en vente libre que vous prenez. De plus, vous devriez les informer de tout produit de santé naturel ou drogue récréative (drogue de rue) que vous prenez.

Les médicaments suivants ne devraient pas être pris avec le Stribild®:

- Chlorhydrate d'alfuzosin (*Xatral*)
- Médicaments contenant de l'ergot (dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine)
- Lovastatine (*Mevacor*)
- Rifampine (*Rifadin, Rifater, Rofact*)
- Salmétérol (*Advair, Serevent*)
- Sildénafil (*Revatio*), lorsque utilisé pour le traitement de problèmes pulmonaires
- Simvastatine (*Zocor*)
- Millepertuis (*Hypericum perforatum*)
- Triazolam

Ne prenez pas le Stribild® avec Atripla®, Complera®, Viread®, Truvada®, Combivir®, Emtriva®, 3TC®, Heptovir®, Kivexa®, Trizivir®, ou Hepsera® puisque ces médicaments contiennent des ingrédients qui dupliquent ou qui sont similaires aux ingrédients du Stribild®.

Informez votre médecin si vous prenez:

- Antiacides (hydroxyde d'aluminium ou magnésium, carbonate de calcium).
Prenez les antiacides au moins 2 heures avant ou après Stribild®.
- Antidépresseurs (trazodone)
- Antifongiques (kétoconazole, itraconazole, voriconazole)
- Antiarythmiques (amiodarone, flécaïnide, quinidine)
- Antibactériens (clarithromycine)
- Antimycobactérien (rifabutine)
- Anticoagulant (warfarine)
- Anticonvulsivants (carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne)
- Antigoutteux (colchicine)
- Béta-bloquants (métoprolol, timolol)
- Bloqueur des canaux calciques (amlodipine, diltiazem, félodipine)
- Corticostéroïdes systémiques (dexaméthasone, fluticasone)
- Antagonistes des récepteurs endothéliaux (bosentan)
- Contraceptifs hormonaux (norgestimate/éthynyl estradiol)
- Immunosuppresseurs (cyclosporine, sirolimus, tacrolimus)
- Neuroleptiques (rispéridone, perphénazine)
- Inhibiteurs de la PDE-5 (sildénafil, tadalafil, vardénafil)
- Sédatifs/hypnotiques (diazépam, flurazépam, buspirone)

La sécurité du Stribild® pendant la grossesse n'est pas bien établie. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou souhaitez le devenir prochainement. Votre médecin peut vous recommander le traitement approprié pour diminuer le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé lorsque

vous êtes porteuse de VIH, puisqu'il y a un risque de transmission par le lait maternel.

Comment CONSERVER ce médicament?

Le Stribild® devrait être gardé au sec, à température pièce (15-30°C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. Assurez-vous que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption («EXP») inscrite à l'extérieur de l'emballage.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous ressentez des effets indésirables, veuillez en discuter avec votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière. Notez vos préoccupations ou vos questions pour vous assurer qu'elles soient abordées.

Le pharmacien suivant est disponible pour répondre à vos questions:

Pharmacien: _____
Téléphone: _____

Référence: Monographie du produit *Stribild* (elvitégravir/emtricitabine/Ténofovir/cobicistat). Gilead Sciences Canada Inc: Mississauga, ON, 2014.

Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2014. Traduction française par Tina Houch & Benoît Lemire, Centre universitaire de santé McGill.

Fiches médicamenteuses additionnelles et mises à jour disponibles au: www.hivclinic.ca

ELVITÉGRAVIR/ COBICISTAT/ TÉNOFOVIR/ EMTRICITABINE (Stribild®)

FICHE MÉDICAMENTEUSE