

ATOVAQUONE SUSPENSION

Autre nom : Mepron®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'atovaquone est utilisée pour traiter la pneumonie à Pneumocystis carinii (PCP) ou pour empêcher cette infection. Elle peut également être utilisée pour traiter le toxoplasma gondii (lésions au cerveau causées par un parasite) ou la diarrhée à cryptosporidium.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'atovaquone est présentée sous forme de liquide à saveur fruitée. Agiter le flacon avant l'utilisation.

La posologie habituelle de la suspension d'atovaquone est de 750 mg (1 cuillère à thé ou 5 mL) deux fois par jour ou 1500 mg (2 cuillères à thé ou 10 mL) une fois par jour. Selon l'infection traitée, des doses plus élevées peuvent être nécessaires.

Il est important de prendre l'atovaquone avec des aliments riches en gras pour faire en sorte que le médicament soit absorbé

complètement dans l'organisme.

Votre dose est :

150 mg / mL de suspension orale

____ mL (____ mg) ____ fois par jour

Prenez l'atovaquone pour la période de temps prescrite. Si vous arrêtez plus tôt, votre infection peut recommencer. Si l'infection s'aggrave ou persiste, consultez votre médecin.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'atovaquone, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'atovaquone est généralement bien tolérée. À l'occasion, l'atovaquone peut causer un certain nombre d'effets indésirables comme **la toux, la diarrhée, le mal de tête, les nausées, les vomissements et des problèmes de sommeil**. Si ces effets se

produisent, ils pourront disparaître pendant le traitement au fur et à mesure que votre organisme s'habitue au médicament. Toutefois, si ces effets vous incommode, parlez-en à votre médecin.

Vous pourrez faire de la **fièvre** ou avoir une **éruption cutanée** (plaques rouges sur la peau). Si ces effets se produisent, vous devez consulter immédiatement votre médecin.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

La suspension d'atovaquone peut tacher les vêtements. Il faut donc faire attention pour éviter de renverser la suspension.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'atovaquone [par exemple, la rifabutine (Mycobutin®) ou la rifampine (Rifadin®, Rofact®)]. L'atovaquone peut également influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre

pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

La sécurité de l'atovaquone n'a pas été établie durant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez discuter de vos préoccupations à ce sujet avec votre médecin ou votre pharmacien.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

La suspension d'atovaquone devrait être entreposée dans un endroit frais (15-25 °C) et sec, protégé de la lumière et hors de la portée des enfants. **NE PAS CONGELER.** S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder dans la salle de bain ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

ATOVAQUONE

SUSPENSION

FEUILLET DE

RENSEIGNEMENTS

Référence : Monographie de Mepron® (atovaquone). St-Laurent, Qc, Canada, GlaxoSmithKline, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca