

## CLOTRIMAZOLE

**Autres NOMS : Canesten®,  
Clotrimaderm®**

### **POURQUOI ce médicament est-il prescrit?**

Le clotrimazole est un antifongique utilisé pour combattre certaines infections de la peau, de la bouche (muguet) et certaines infections vaginales (à levures).

### **COMMENT ce médicament doit-il être pris?**

Le clotrimazole agit lorsqu'il entre en contact avec les levures ou les champignons et lorsqu'il est utilisé plusieurs fois par jour. Le clotrimazole doit être utilisé régulièrement pour être efficace.

#### **☐ Infections de la gorge / bouche :**

Faire dissoudre les pastilles ou les comprimés dans la bouche pendant 15 à 30 minutes. Ne pas les mâcher ni les avaler en entier.

Si on vous a prescrit la suspension, rincez-vous bien la bouche avec la solution, puis avalez-la ou crachez-la, selon les directives de votre médecin ou de votre pharmacien.

Votre dose est la suivante :

---

#### **☐ Infections de la peau :**

Nettoyez la région infectée et la peau avoisinante. Appliquez une mince couche de crème ou d'onguent et faites pénétrer doucement dans la région infectée et avoisinante deux fois par jour. Lavez-vous les mains par la suite.

Votre dose est la suivante :

---

#### **☐ Infections vaginales :**

Si c'est la première fois que vous avez des démangeaisons vaginales ou un écoulement vaginal, communiquez avec votre médecin.

La crème, les comprimés ou les suppositoires de clotrimazole sont habituellement insérés dans le vagin au coucher pour traiter les infections à levure.

Remplissez l'applicateur fourni avec la crème ou mettez le suppositoire ou le comprimé sur l'applicateur. En position couchée, les genoux relevés et écartés, insérez l'applicateur dans le vagin et poussez le piston pour déposer le médicament. Retirez l'applicateur et nettoyez-le si vous devez le réutiliser. Lavez-vous les mains.

Portez des sous-vêtements en coton propres durant le traitement. Vous pouvez porter une serviette sanitaire pour protéger vos vêtements ou vos draps. Vous pouvez utiliser le clotrimazole durant vos menstruations. Évitez toutefois d'utiliser des tampons durant le traitement.

Votre dose est la suivante :

---

### **Que faire si vous OUBLIEZ une dose?**

Si vous oubliez de prendre une dose de clotrimazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

### **Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?**

Le clotrimazole cause généralement peu d'effets indésirables. Une **sensation de brûlure, des démangeaisons ou une rougeur** peuvent survenir au point d'application. Si vous prenez le clotrimazole par voie orale (sous forme de liquide ou comprimé), vous pourriez avoir des **nausées ou des vomissements**.

Comme pour toutes les crèmes et les onguents, des allergies de la peau

peuvent survenir avec le clotrimazole. Consultez un médecin et cessez de prendre ce médicament si vous avez des rougeurs (éruptions) sur tout le corps.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin afin de pouvoir suivre vos progrès.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?**

La préparation vaginale de clotrimazole ne devrait pas être utilisée durant le premier trimestre de grossesse, sauf si votre médecin juge que les bienfaits l'emportent sur les risques. Si vous pensez être enceinte, avisez votre médecin.

Même si les symptômes de votre infection disparaissent après un à trois jours, continuez de prendre le clotrimazole pour toute la durée du traitement prescrit par votre médecin, sinon votre infection pourrait réapparaître. Si l'infection s'aggrave ou persiste une fois le traitement terminé, consultez votre médecin qui réévaluera votre infection.

**Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

Le clotrimazole devrait être conservé à la température de la pièce dans un

endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Canesten® (clotrimazole). Etobicoke, On, Canada: Bayer Consumer, 2000. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***CLOTRIMAZOLE***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***