

DAPSONE

Autre NOM : Avlosulfon®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La dapsonne est utilisée pour la prévention et le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC) et des infections à *Toxoplasma gondii*.

La dapsonne est habituellement utilisée pour les personnes ayant eu des effets indésirables ou une toxicité au médicament de choix de la PPC, le triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX, Bactrim®, Septra®). La dapsonne est une solution de rechange sûre et efficace.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Pour la prévention de la PPC, la dapsonne est administrée seule ou en association avec divers autres médicaments, dont le triméthoprime (Proloprim®), la pyriméthamine (Daraprim®) et l'acide folinique (Leucovorin®). La dose habituelle de dapsonne est de 100 mg par jour, mais cette dose peut varier lorsque le médicament est administré en association.

Pour le traitement de l'infection à PPC, la dapsonne est administrée à raison de 100 mg par jour en association avec le triméthoprime (Proloprim®) (15 mg/kg/jour en 3 à 4 doses divisées) pendant 21 jours.

Pour le traitement des infections à *toxoplasma gondii*, la dapsonne à 50 ou 100 mg par jour est administrée avec de la

pyriméthamine (Daraprim®) et de l'acide folinique (Leucovorin®).

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 25 mg
- comprimé à 100 mg

___comprimés(s)(___ mg)___fois par jour

La dapsonne peut être prise avec ou sans nourriture. Mais si vous avez des troubles d'estomac ou des nausées, vous devriez la prendre avec de la nourriture.

La dapsonne ne devrait pas être prise en même temps que la didanosine (Videx^{MC}), des anti-ulcéreux [ranitidine (Zantac®), famotidine (Pepcid®), pantoprazole (Pantoloc^{MC}), lansoprazole (Prevacid®), oméprazole (Losec®), rabéprazole (Pariet®), ésoméprazole (Nexium^{MC})] ni des antiacides (Maabx®, Tums®, etc.) puisque ces médicaments peuvent diminuer l'absorption de la dapsonne. Si vous devez prendre ces médicaments, prenez-les au moins 2 heures après la prise de dapsonne.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de dapsonne, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La dapsonne peut occasionner diverses manifestations indésirables rares au niveau du sang, dont les plus graves sont l'**anémie hémolytique** (décomposition des globules rouges) et la **méthémoglobinémie** (augmentation de la forme d'hémoglobine ne pouvant pas transporter l'oxygène). Une **leucopénie** (diminution du nombre de globules blancs augmentant votre risque d'infections bactériennes) peut aussi survenir. Ces effets varient en fonction de la quantité de dapsonne prise et du fait que votre niveau de globules rouges est peut-être déjà faible. Des tests de laboratoire réguliers sont essentiels. Avisez votre médecin si vous avez des symptômes tels que fatigue, essoufflement, battements du cœur rapides, fièvre et frissons.

Mais, en général, la dapsonne est bien tolérée. D'autres manifestations indésirables peuvent comprendre : **éruptions (plaques rouges sur la peau), démangeaisons, nausée, vomissements, mal de tête, étourdissements, faiblesse musculaire, sensation de picotement ou d'engourdissement dans les mains et les orteils**. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez une éruption cutanée avec ou sans fièvre.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

La dapsonne a été utilisée par des femmes enceintes sans signe de malformation ni

d'effets nocifs sur le fœtus. Mais comme pour tous les médicaments, on doit déterminer si ses bienfaits l'emportent sur les risques possibles. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous prenez de la dapsonsé puisque certains effets indésirables tels que l'anémie hémolytique peuvent se manifester chez le nourrisson. Si vous êtes enceinte ou allaitez, veuillez en discuter avec votre médecin.

De nombreux médicaments peuvent influencer l'effet de la dapsonsé et celle-ci peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants :

- probénécide (Benuryl^{MC})
- Rifabutine (Mycobutin®)
- Rifampine (Rifadin®, Rimactane®, Rofact^{MC})
- warfarine (Coumadin®)

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés de dapsonsé doivent être conservés dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur

l'emballage. Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Dapsonsé® (dapsonsé). Princeton, NJ, É.-U. : Jacobus Pharmaceutical Co., Inc., 1997. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

DAPSONE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***