

DARUNAVIR

Autres NOMS : Prezista^{MC}

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Le darunavir est un antirétroviral (anti-VIH) appartenant à une classe de médicaments appelée **inhibiteurs de la protéase**. Les inhibiteurs de la protéase empêchent la maturation des particules virales infectieuses en se liant fortement à l'enzyme nécessaire à l'obtention de VIH infectieux.

Le darunavir est toujours utilisé en association avec le ritonavir et d'autres antirétroviraux pour retarder l'évolution de l'infection par le VIH chez les adultes ayant reçu par le passé des traitements antirétroviraux qui ont échoué. Avec ce traitement, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation du taux de cellules CD4⁺) et vous serez ainsi mieux protégé contre les infections, grâce à la réduction de la charge virale.

On ne connaît pas les effets à long terme du darunavir pour l'instant. D'autres études sont en cours. Le darunavir a été approuvé par Santé Canada à condition que le fabricant continue de mener des essais afin de démontrer l'innocuité (sécurité) et l'efficacité du produit.

Le darunavir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le virus. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. Le traitement par le darunavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. C'est pourquoi vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose de darunavir est de 600 mg et se prend avec 100 mg de ritonavir deux fois par jour, ou de 800 mg avec 100 mg de ritonavir une fois par jour. Il faut prendre le darunavir et le ritonavir avec un repas ou une collation nourrissante.

Voici votre posologie :

- comprimé enrobé orange à 300 mg
- comprimé enrobé orange pâle à 400 mg
- comprimé enrobé orange à 600 mg

_____ comprimés (____mg) ____ fois par jour

plus :

- capsule de ritonavir à 100 mg

_____ capsule(s) ____ fois par jour

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de darunavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi il ne faut pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de darunavir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera encore et l'état de votre système immunitaire s'aggravera. Quelques doses oubliées peuvent suffire pour rendre le darunavir inactif. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsqu'il y a résistance, d'autres antirétroviraux dont le mode d'action est semblable à celui du darunavir peuvent aussi devenir inactifs. **Par conséquent,**

le fait d'oublier des doses de darunavir peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir. Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devez toujours prendre vos doses de darunavir. S'il vous plaît, n'arrêtez pas de prendre le darunavir sans d'abord en parler avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

La plupart des effets indésirables signalés avec le darunavir étaient légers et peu fréquents. Ces effets comprennent l'insomnie, la fièvre, la diarrhée, la douleur au ventre, les nausées, les vomissements, les maux de tête, la perte d'appétit et la fatigue. Si vous ressentez ces effets et qu'ils vous dérangent, veuillez appeler la clinique ou en parler lors de votre prochaine visite.

On fera régulièrement des analyses de sang pour détecter tout changement dans le fonctionnement de votre foie ou de votre pancréas. De plus, votre médecin vérifiera si vos taux de cholestérol, de triglycérides et de sucre dans le sang ont augmenté.

Une prise anormale de poids et des changements dans la forme du corps ont été signalés avec d'autres inhibiteurs de la protéase. Nous ne savons pas si le darunavir causera ces changements.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Des études indiquent que la prise d'une dose de darunavir plus élevée que celle prescrite n'apporte aucun bienfait additionnel et peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez une dose de darunavir moins élevée que celle prescrite, le VIH peut devenir résistant à l'antirétroviral.

Certains médicaments peuvent augmenter et diminuer l'effet du darunavir. De plus, le darunavir pourrait influencer sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez. Vous devez aussi les informer des produits naturels et des drogues à usage récréatif (illégales) que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Ne prenez PAS les médicaments suivants avec le darunavir :

- amiodarone (Cordarone[®])
- dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine [Cafergot[®], Bellergal[®], Ergodryl[®], Gravergol[®]], ergonovine, dihydroergotamine [Migranal^{MD}], méthylergonovine [Methergine[®]])
- lidocaïne (systémique)
- midazolam (Versed[®])
- quinidine
- pimozide (Orap[®])
- rifampine (par exemple Rifadin[®], Rimactane[®], Rofact[®])
- triazolam (Halcion[®])

L'innocuité (sécurité) du darunavir durant la grossesse n'a pas été établie. Le darunavir ne doit être utilisé pendant la grossesse que si le bienfait potentiel l'emporte sur le risque potentiel. Un registre a été établi pour surveiller les patientes sous darunavir pendant qu'elles sont enceintes. Si vous êtes enceinte, veuillez en

informer votre médecin qui pourra vous inscrire au registre en composant le 1 800 258-4263. Votre médecin peut vous recommander le traitement approprié pour réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. Il n'est pas recommandé d'allaiter votre enfant si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez lui transmettre le virus par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

Il faut conserver les comprimés enrobés de darunavir dans un endroit frais (15 à 30 °C) et sec, hors de la portée des enfants.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de ce médicament ou si vous ressentez des effets indésirables, veuillez en parler à votre pharmacien, à votre médecin ou à votre infirmière.

Notez vos questions ou inquiétudes pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de *Prezista*^{MC} (darunavir). Janssen-Ortho Inc., Toronto (Ontario) Canada, 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2009.

Des feuillets d'information supplémentaires et des mises à jour concernant la médication se trouvent à l'adresse suivante : www.hivclinic.ca (en anglais seulement)

DARUNAVIR

(PREZISTA^{MC}) –

FEUILLET

D'INFORMATION