

ÉTRAVIRINE

Autre NOM : Intelence^{MC}

Pourquoi prescrit-on ce médicament?

L'étravirine est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Elle est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux chez des patients adultes qui ont déjà été traités et n'ont pas répondu à une thérapie antirétrovirale antérieure, et qui sont porteurs de souches du VIH-1 résistantes aux autres antirétroviraux et aux INNTI. L'étravirine est utilisée pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺) et vous serez mieux protégé contre les infections.

L'étravirine ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, elle aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration d'étravirine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose recommandée d'étravirine est de 200 mg (2 comprimés à 100 mg) deux fois par jour au cours d'un repas. Le type de nourriture importe peu, mais l'étravirine doit toujours être prise avec d'autres antirétroviraux au cours d'un repas.

Voici votre posologie :

comprimés blancs à 100 mg

_____ comprimés (_____ mg) deux fois par jour

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose d'étravirine, et que moins de **6 heures** se sont écoulées depuis l'heure habituelle de la prise, prenez-la dès que possible, avec un repas; vous prendrez ensuite la dose suivante à l'heure prévue. Cependant, si plus de **6 heures** se sont écoulées depuis l'heure de la dose oubliée, ne prenez pas de dose avant votre prochaine dose prévue.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses d'étravirine, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que l'étravirine cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à l'étravirine peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses d'étravirine peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre l'étravirine sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Certaines personnes qui prennent l'étravirine peuvent présenter une éruption cutanée légère à modérée. Les autres effets secondaires comprennent les nausées, la diarrhée, les vomissements, l'insomnie et l'anxiété. Certains patients peuvent présenter des troubles du foie et un jaunissement des yeux.

Communiquez avec votre médecin immédiatement si vous présentez une éruption cutanée pendant le traitement par l'étravirine. Dans la majorité des cas, cet effet peut être traité à l'aide d'anti-inflammatoires ou d'antihistaminiques. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un médicament pour traiter une éruption cutanée.

Si vous présentez une éruption cutanée grave ou une éruption cutanée accompagnée de symptômes tels que fièvre, ampoules sur la peau, plaies dans la bouche, rougeur des yeux, enflure, douleurs musculaires ou articulaires et sensation générale de malaise, **CESSEZ** de prendre l'étravirine. **Consultez immédiatement votre médecin.**

Votre médecin fera régulièrement des tests sanguins pour déceler tout changement dans la fonction de votre foie et dans vos taux de cholestérol et de triglycérides.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses d'étravirine plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses d'étravirine plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à l'étravirine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'étravirine. De plus, l'étravirine peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels et des

drogues à usage récréatif (illégal) que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les doses de certains médicaments auront peut-être besoin d'être augmentées si vous prenez de l'étravirine.

L'étravirine ne doit PAS être prise si vous êtes enceinte. Veuillez informer votre médecin si vous pensez être enceinte ou si vous souhaitez devenir enceinte bientôt. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. Un registre a été créé pour suivre les patientes qui sont exposées à l'étravirine durant la grossesse. Votre médecin peut vous inscrire à ce registre en composant le 1 800 258-4263. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

L'étravirine doit être conservée dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants, dans son flacon d'origine. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. Ne pas enlever les petits sachets de produit déshydratant fournis avec le médicament.

Ne pas conserver ce produit dans la salle de bains ni la cuisine, car la chaleur et l'humidité pourraient rendre le médicament moins efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

ÉTRAVIRINE

FEUILLET DE

RENSEIGNEMENTS

Référence : Monographie d'Intelence^{MC} (étravirine). Janssen-Ortho Inc., Toronto (Ontario), Canada : 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca