

FLUCONAZOLE

Autre nom : Diflucan^{MC}

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le fluconazole est un antifongique utilisé pour traiter les infections à champignons de la bouche (muguet), de l'œsophage, de l'appareil génital (infection à levures) et d'autres régions. Il peut aussi être utilisé pour prévenir la récurrence de méningite à *Cryptococcus* (infection du cerveau).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le fluconazole est offert sous forme de comprimés à 50, 100 et 150 mg, et aussi sous forme de solution pour injection intraveineuse et suspension orale.

La dose de fluconazole est fonction du type d'infection traitée. Il est normalement administré une fois par jour. La dose pourrait être ajustée si vous avez des problèmes de reins.

Le fluconazole peut être pris avec ou sans nourriture.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 50 mg

comprimé à 100 mg

comprimé à 150 mg

____ comprimés (____ mg) ____ fois par jour

ou

suspension orale à 10 mg / mL

____ mL (____ mg) ____ fois par jour

Bien agiter avant chaque usage

ou

solution intraveineuse à 2 mg / mL

injection intraveineuse de ____ mL (____ mg) ____ fois par jour pendant ____ heure(s)

Prendre le fluconazole pour toute la durée prescrite. Si vous cessez de le prendre avant, votre infection pourrait revenir. Consultez votre médecin si l'infection s'aggrave ou persiste.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de fluconazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement votre dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Le fluconazole est généralement bien toléré, mais peut parfois causer des **malaises d'estomac, des nausées ou des vomissements**. Autres effets indésirables possibles : **douleur abdominale, diarrhée et maux de tête**. Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez ces effets.

Le fluconazole peut augmenter les **enzymes du foie** sans qu'il n'y ait de symptômes. De rares cas d'**hépatite** (inflammation du foie) peuvent survenir. Les signes d'hépatite comprennent une coloration jaune dans les yeux et sur la peau, une fièvre, des nausées et/ou des vomissements, une urine foncée, des selles pâles, une fatigue et une douleur abdominale.

D'autres effets indésirables rares pouvant survenir comprennent : **rougeurs (éruptions) sur la peau, diminution des globules blancs** (cellules combattant les infections) et **diminution des plaquettes** (nécessaires à la coagulation du sang). Avisez votre médecin si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, saignements ou bleus.

Votre médecin effectuera des tests sanguins régulièrement pour vérifier la

fonction de votre foie, ainsi que le nombre de globules blancs et de plaquettes.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Certains médicaments peuvent intensifier ou diminuer l'effet du fluconazole. De plus, le fluconazole peut influencer l'effet de certains médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Vous ne devriez PAS prendre les médicaments suivants si vous prenez du fluconazole :

- Astémizole (Hismanal®)
- Cisapride (Prepulsid®)
- Terfénadine (Seldane®)

La sécurité du fluconazole durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été déterminée. Veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le fluconazole doit être gardé dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. La suspension orale diluée de fluconazole est stable pendant 14 jours après la date de préparation lorsqu'elle est gardée à la température de la pièce (15-30 °C). S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Diflucan[™] (fluconazole). Kirkland, Qc, Canada : Pfizer Canada Inc, 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

FLUCONAZOLE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***