

# FOSAMPRENAVIR

**Autre NOM :** Telzir®

## POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Le fosamprenavir est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des **inhibiteurs de la protéase**. Les inhibiteurs de la protéase agissent à une étape de la reproduction du virus différente de celle des autres catégories de médicaments disponibles auparavant pour combattre le VIH. Le fosamprenavir est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux (généralement avec le ritonavir) pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4<sup>+</sup>) et vous serez mieux protégé contre les infections.

Le fosamprenavir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de fosamprenavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT doit-on prendre ce médicament?

Le fosamprenavir est présenté sous forme de **comprimé pelliculé à 700 mg** facile à avaler et sous forme de **suspension orale contenant 50 mg/ml** de médicament actif. **La dose de fosamprenavir à 1 400 mg (2 comprimés à 700 mg) en association avec le ritonavir à 200 mg (2 comprimés à 100 mg) peut être prise une fois par jour ou divisée en deux doses toutes les 12 heures.** Cette dose aura peut-être besoin d'être ajustée en fonction de vos besoins particuliers ou si vous prenez d'autres inhibiteurs de la protéase.

Le fosamprenavir existe également sous forme de suspension orale à 50 mg/ml pour les patients qui ont de la difficulté à avaler les comprimés. La suspension, de couleur blanc cassé, est aromatisée à la gomme aux raisins et à la menthe poivrée. Bien agiter le flacon avant de prendre la dose. Cette suspension doit être prise à jeun et sans nourriture.

Les comprimés de fosamprenavir peuvent être pris avec ou sans nourriture.

Voici votre posologie :

\_\_\_ comprimés (\_\_\_ mg) \_\_\_ fois par jour +

\_\_\_ ritonavir (\_\_\_ mg) \_\_\_ fois par jour, OU

suspension orale à 50 mg/ml

\_\_\_ ml (\_\_\_ mg) \_\_\_ fois par jour +

\_\_\_ ritonavir (\_\_\_ mg) \_\_\_ fois par jour

Avaler les comprimés avec un peu d'eau ou une boisson non alcoolisée.

Éviter la consommation excessive d'alcool pendant le traitement par le fosamprenavir. Si vous prenez le fosamprenavir sous forme de suspension, il vaut mieux éviter complètement les boissons alcoolisées.

## Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de fosamprenavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de fosamprenavir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que le fosamprenavir cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé résistance. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables au fosamprenavir peuvent aussi devenir inefficaces. Par conséquent, si vous oubliez de prendre des doses de fosamprenavir, vous risquez de diminuer le nombre d'options de traitement pour l'avenir.

Ne cessez pas de prendre le fosamprenavir sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Les effets secondaires les plus couramment signalés avec le fosamprenavir comprennent : maux d'estomac, flatulences, douleur abdominale, diarrhée et vomissements. En général, il est possible de soulager les maux de tête avec des médicaments en vente libre, comme l'acétaminophène (Tylenol®).

Les autres effets secondaires pouvant survenir sont la fatigue et une élévation du taux de cholestérol dans le sang. Des patients ont présenté des éruptions cutanées, mais dans la plupart des cas, cet effet disparaît spontanément, sans qu'il soit nécessaire d'arrêter le traitement. De rares cas d'éruption cutanée grave ont été signalés. Si vous êtes allergique aux sulfamides, dites-le à votre médecin. Si ces effets se manifestent et sont incommodes, veuillez appeler la clinique ou en parler lors de votre prochaine visite.

Des tests sanguins seront effectués régulièrement afin de détecter tout changement dans la fonction de votre foie et de votre pancréas. Votre médecin effectuera aussi des tests pour déceler toute augmentation de vos taux de cholestérol, de triglycérides et de glycémie.

Les effets à long terme du fosamprenavir sont inconnus pour l'instant. Des études sont présentement en cours. Une prise anormale de poids et des changements dans la forme du corps ont été signalés, mais il n'a pas été déterminé si le fosamprenavir en était la cause.

**Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.**

## Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses de fosamprenavir plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses de fosamprenavir plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à l'amprénavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du fosamprénavir. De plus, le fosamprénavir peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance, et mentionnez-leur les produits à base de plantes médicinales ainsi que les suppléments nutritionnels que vous prenez. Vous devez également les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

**Ne PAS prendre les médicaments suivants avec le fosamprénavir :**

- Diazépam (Valium®)
- Dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine [Cafergot®, Bellergal®, Ergodryl<sup>MC</sup>, Gravergol®], ergonovine, dihydroergotamine [Migranal<sup>MD</sup>], méthylergonovine [Methergine])
- Flécaïnide (Tambacor®)
- Flurazépam
- Midazolam (Versed®)
- Pimozide (Orap®)
- Propafénone (Rhythmol®)
- Rifampine (p. ex., Rifadin®, Rimactane®, Rofact®)
- Millepertuis
- Triazolam (Halcion®)

L'efficacité des **contraceptifs oraux** ou d'autres hormones utilisées pour éviter la grossesse risque de diminuer si vous prenez le fosamprénavir. Une deuxième méthode de contraception doit toujours être utilisée. En général, même si vous ne prenez pas de fosamprénavir, l'emploi de condoms est toujours recommandé pour réduire le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

L'innocuité du fosamprénavir pendant la grossesse n'a pas été établie. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

Les comprimés de fosamprénavir doivent être conservés à une température comprise entre 15 et 30 °C et la suspension orale entre 2 et 30 °C. Conserver les comprimés dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. La suspension doit être protégée du gel. Garder le médicament hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. La suspension a une durée de conservation de 28 jours à partir de la date où elle est délivrée (le pharmacien inscrira cette date sur le côté du flacon).

Ne pas conserver ce produit dans la salle de bains, car la chaleur et l'humidité pourraient rendre le médicament moins efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière. Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière. Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.**

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

**Pharmacien(ne) :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Telzir® (fosamprénavir). Saint-Laurent (Québec), Canada : GlaxoSmithKline, 2009. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2005. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

# **FOSAMPRÉNAVIR**

## **FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS**