

LOPÉRAMIDE

Autre NOM : Imodium®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le lopéramide est utilisé pour traiter la diarrhée soudaine à court terme ou la diarrhée chronique. Le lopéramide peut diminuer la fréquence des mouvements intestinaux et raffermir les selles, tout en améliorant certains symptômes accompagnant la diarrhée, dont la douleur abdominale, le gonflement et la flatulence (gaz).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le lopéramide est offert sous forme d'un comprimé à 2 mg devant être avalé et sous forme d'un comprimé à dissolution rapide de 2 mg devant être placé sur la langue. Le lopéramide peut être utilisé à l'occasion au besoin ou régulièrement pour traiter la diarrhée chronique plus persistante.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 2 mg (pour avaler)
- comprimé à dissolution rapide à 2 mg (à placer sur la langue)

____ comprimés (____mg) après la première incidence de selles molles, suivis de ____ comprimés (____mg) après chaque selle molle, jusqu'à ce que la diarrhée disparaisse

ou

____ comprimés (____mg) ____ fois par jour

Vous ne devriez jamais dépasser la dose de 16 mg (8 comprimés) de lopéramide en 24 heures.

Sur la recommandation d'un médecin, le lopéramide peut être administré à des enfants âgés entre 2 et 12 ans. Le médecin déterminera la dose appropriée en fonction du poids de l'enfant.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de lopéramide, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les effets indésirables possibles sont habituellement légers et temporaires. Certaines personnes pourraient avoir les effets suivants : **constipation, somnolence, malaise abdominal, étourdissements, fatigue, sécheresse de la bouche, nausées et vomissements.** Une réaction allergique accompagnée de **rougeurs (éruptions) sur la peau** et de **démangeaisons** peut parfois se manifester. En cas d'éruption cutanée (rougeurs sur la peau), cessez de prendre le lopéramide et communiquez avec votre médecin.

Si vous prenez le comprimé à dissolution rapide, vous pourriez ressentir une sensation de brûlure ou de picotement sur la langue.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Vous ne devriez pas utiliser le lopéramide si vous avez de la fièvre ou si vos selles sont tachées de sang. Consultez votre médecin si vous avez ces symptômes ; vous devriez peut-être prendre des antibiotiques pour traiter la diarrhée.

Vous ne devriez pas prendre le lopéramide si vous avez déjà eu une réaction allergique à ce médicament ou si vous avez une maladie intestinale (cancer du côlon, colite ulcéreuse, maladie de Crohn). Consultez votre médecin pour savoir comment traiter la diarrhée dans de telles circonstances.

Cessez immédiatement de prendre le lopéramide en cas de constipation ou de douleurs abdominales intenses. Vous devriez aussi cesser de prendre ce médicament et consulter un médecin si la diarrhée aiguë ne s'améliore pas après 48 heures.

La sécurité du lopéramide durant la grossesse et l'allaitement n'a pas été déterminée. Veuillez discuter avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet.

La diarrhée est souvent accompagnée de déshydratation. Il est essentiel de boire des quantités suffisantes de liquide pour éviter la déshydratation. Si votre diarrhée est légère (moins de 4 selles par jour), boire des boissons gazeuses sans caféine, du jus ou des boissons réhydratantes peut être suffisant. Si la diarrhée est plus grave, des boissons réhydratantes spéciales peuvent être indiquées. On peut se procurer ces produits en pharmacie (Pedialyte® ou Gastrolyte®). Ces boissons contiennent du sucre et d'autres substances que vous risquez de perdre en raison de la diarrhée (sodium, potassium). Votre pharmacien vous indiquera la quantité de ces boissons à prendre pour éviter la déshydratation.

Vous devriez consulter un médecin si vous avez un ou plusieurs symptômes associés à la déshydratation, dont une sécheresse de la bouche, une soif excessive, la peau plissée, peu ou pas d'urine, des étourdissements et une sensation de tête légère.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés de lopéramide et les comprimés à dissolution rapide doivent être gardés dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de d'Imodium® (lopéramide). Guelph, ON, Canada : McNeil Consumer HealthCare, 2000. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

LOPÉRAMIDE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***