

VALGANCICLOVIR

Autre nom : Valcyte^{MC}

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le valganciclovir est un médicament utilisé pour le traitement de la rétinite à cytomégalovirus. Il peut être administré pour traiter cette infection de l'oeil et pour empêcher la rétinite à cytomégalovirus d'évoluer. Vous devriez faire examiner vos yeux régulièrement.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le valganciclovir est présenté en comprimés à 450 mg.

La dose de valganciclovir pour le traitement d'une rétinite à cytomégalovirus qui vient d'être diagnostiquée est de 900 mg (2 x 450 mg) deux fois par jour.

Une fois que la rétinite a été stabilisée (habituellement après plus ou moins 3 semaines de traitement), une dose d'entretien de 900 mg (2 x 450 mg) une fois par jour peut être administrée.

Il faudra peut-être ajuster les doses si vous avez des problèmes aux reins.

Le valganciclovir devrait être pris avec de la nourriture.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 450 mg

___comprimés (___mg)___fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de valganciclovir, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables ?

L'effet indésirable le plus grave du valganciclovir est **une diminution du nombre de globules blancs**. Ce qui peut augmenter votre risque de contracter des infections puisque les globules blancs sont nécessaires pour combattre les infections. Le valganciclovir peut également **diminuer le nombre de plaquettes** dans le sang, ce qui peut augmenter votre risque de saignement et de bleus puisque les plaquettes ont un rôle à jouer dans la coagulation du sang. Vos **globules rouges peuvent aussi diminuer** vous causant de la fatigue et un essoufflement. Des tests sanguins seront effectués régulièrement pour vérifier ces valeurs. S'il y a des changements, la dose de valganciclovir sera réduite ou l'administration du médicament arrêtée. Avisez votre médecin si vous remarquez des symptômes de fièvre, frissons, d'essoufflement, d'accélération de la fréquence cardiaque, de fatigue, de saignement ou de bleus.

Si vous vous sentez confus ou si vous avez des sautes d'humeur, des pensées ou des rêves anormaux ou une éruption cutanée (plaques rouges sur la peau) en prenant le valganciclovir, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

Vous pourrez peut-être avoir des **nausées, des vomissements, de la diarrhée, des étourdissements, de la fièvre ou des maux de tête**. Si ces effets se produisent et qu'ils sont incommodants, veuillez communiquer

avec votre médecin ou votre pharmacien ou discutez-en avec eux à votre prochaine visite.

Votre sang sera analysé pour vérifier la fonction de votre foie et de vos reins.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Ne cessez pas de prendre ce médicament sans vérifier d'abord avec votre médecin, même si vous vous sentez bien. Maintenez vos visites régulières et avisez votre médecin de tout nouveau problème médical qui se manifeste pendant que vous prenez le valganciclovir.

Le valganciclovir peut causer une stérilité temporaire ou permanente chez les hommes et les femmes. Des malformations du fœtus se sont produites chez les animaux ; par conséquent, le valganciclovir n'est PAS recommandé pendant la grossesse, et les hommes et les femmes devraient utiliser un moyen de contraception de barrière (comme des condoms) pendant le traitement et pendant 90 jours après la fin du traitement. On ne sait pas si le valganciclovir est excrété dans le lait maternel. En raison des complications qui ont été observées chez les animaux traités par le valganciclovir, il est possible que les nourrissons allaités le soient également. Par conséquent, le valganciclovir ne doit PAS être administré aux mères qui allaitent. Veuillez discuter de vos préoccupations à ce sujet avec votre médecin ou votre pharmacien.

Mentionnez à votre médecin si vous avez eu une réaction allergique ou un effet indésirable à d'autres agents antiviraux comme l'acyclovir (Zovirax®), le valacyclovir (Valtrex®), le

famciclovir (Famvir®) ou le ganciclovir (Cytovene®).

Puisque le valganciclovir est éliminé par les reins, il est important d'aviser votre médecin si vous avez des troubles aux reins avant de prendre ce médicament.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du valganciclovir. Le valganciclovir peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est très important de leur dire si vous prenez du probénécide (Benemid®), de la didanosine (Videx^{MC}), ou de la zidovudine (Retrovir®).

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le valganciclovir devrait être entreposé dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, protégé de la lumière et hors de la portée des enfants. Ne pas garder dans la salle de bains ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

VALGANCICLOVIR

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***

Référence : Monographie de Valcyte^{MC} (valganciclovir).
Mississauga, On, Canada : Hoffmann-La Roche Limited, 2002.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty
Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site :
www.hivclinic.ca