

# ABACAVIR ET LAMIVUDINE

**Autre NOM :** Kivexa® (association de lamivudine à 300 mg et d'abacavir à 600 mg dans chaque comprimé)

## POURQUOI prescrit-on ce médicament?

Ce médicament contient de la lamivudine et de l'abacavir, deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Il est administré en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4<sup>+</sup>) et vous serez mieux protégé contre les infections.

La lamivudine et l'abacavir ne guérissent pas le sida et ne tuent pas complètement le VIH. Par contre, ils aident à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. Le traitement du VIH ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La posologie habituelle est de 1 comprimé par jour. Ce médicament peut être pris avec ou sans aliments.

Voici votre posologie :

\_\_\_\_ comprimé \_\_\_\_ fois par jour

## Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de ce médicament, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que les deux composants, la lamivudine et l'abacavir, cessent d'être efficaces. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à la lamivudine et à l'abacavir peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses de ce médicament peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre ce médicament sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

La plupart des effets indésirables sont légers et souvent temporaires et peuvent comprendre : maux de tête, étourdissements, nausées, vomissements, baisse de l'appétit, fatigue, sensation générale de malaise, engourdissement ou sensation de picotement dans les doigts, les orteils ou les membres et insomnie. Votre médecin et votre pharmacien pourront vous conseiller sur la manière de soulager ces effets.

Les effets graves observés avec la lamivudine comprennent l'anémie (réduction du nombre de globules rouges qui peut causer une fatigue ou un essoufflement), la leucopénie (diminution du nombre de globules blancs pouvant accroître le risque d'infection bactérienne) et la thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes pouvant augmenter le risque de saignement ou de bleus). Ces effets indésirables surviennent habituellement après avoir pris le médicament pendant longtemps. Des tests sanguins seront effectués régulièrement pour vérifier tout changement de ces valeurs. Veuillez aviser votre médecin si vous présentez des symptômes tels qu'une fièvre, des frissons, un essoufflement, un battement de cœur rapide, une fatigue, des saignements ou des bleus.

De rares cas de crampes abdominales très intenses accompagnées de vomissements peuvent survenir et être causés par une inflammation du pancréas (pancréatite). Consultez immédiatement un médecin si vous présentez ces symptômes.

Des tests sanguins seront effectués régulièrement pour vérifier tout changement de la fonction de votre foie ou pancréas.

Rarement, une réaction grave appelée **RÉACTION D'HYPERSENSIBILITÉ** peut survenir (chez 4 % des patients). Cette réaction peut être causée par l'abacavir, l'un des deux composants du médicament. Cette réaction survient généralement au cours des 6 premières semaines du traitement par l'abacavir. De nombreuses personnes, mais pas toutes, vont présenter une **éruption cutanée**. Cette réaction peut aussi comprendre des symptômes **pseudo-grippaux, tels que la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires, la fatigue et une sensation générale de malaise. Les autres symptômes pouvant accompagner cette réaction sont : nausées, vomissements, diarrhée, plaies dans la bouche, ampoules sur la peau, enflure du cou, des yeux et de la langue, rougeur des yeux, essoufflement, toux, mal de gorge et tension artérielle basse.**

**Avisez votre médecin immédiatement si vous présentez une éruption cutanée ou deux des autres symptômes mentionnés ci-dessus.** Vous devrez être évalué et vous devrez peut-être arrêter définitivement de prendre le médicament. **Si l'on vous dit d'arrêter de prendre ce médicament, vous ne devez plus JAMAIS le prendre, car il pourrait provoquer une réaction mettant votre vie en danger. De même, vous ne devez JAMAIS prendre Ziagen® ou Trizivir™, car ces médicaments contiennent aussi de l'abacavir.**

Si vous ne pouvez pas joindre votre médecin ou votre pharmacien, vous pouvez appeler la ligne de soutien canadienne pour Ziagen®. C'est une ligne d'assistance téléphonique 24 heures, bilingue et sans frais. Le numéro de téléphone est le 1 800 868-8898.

**Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?**

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à la lamivudine et à l'abacavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la lamivudine et de l'abacavir. De plus, la lamivudine et l'abacavir peuvent avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

Il doit être conservé dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver ce produit dans la salle de bains ni la cuisine, car la chaleur et l'humidité pourraient rendre le médicament moins efficace.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.**

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

**Pharmacien(ne) :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Kivexa® (abacavir/lamivudine). Mississauga (Ontario), Canada : GlaxoSmithKline, 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***ABACAVIR ET  
LAMIVUDINE***

***(KIVEXA®)***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***