

Triumeq® (Dolutégravir, Abacavir, et Lamivudine)

QU'EST-CE QUE le Triumeq®?

- Un comprimé violet contenant 3 différents médicaments anti-rétroviraux (anti-VIH) :
 - Dolutégravir 50mg
 - Abacavir 600mg
 - Lamivudine 300mg
- Le dolutégravir appartient à un groupe de médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs de l'intégrase, alors que l'abacavir et la lamivudine appartiennent à un groupe de médicaments anti-VIH appelés inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse.
- La combinaison du dolutégravir, de l'abacavir et de la lamivudine offre une option de traitement pour le VIH ne nécessitant qu'un seul comprimé.
- Le Triumeq® ne guérit PAS le VIH.

POURQUOI le Triumeq® est-il prescrit?

- Pour réduire le nombre de virus dans votre système à un niveau indétectable.
- Pour garder votre système immunitaire fort et ainsi prévenir l'apparition d'infections opportunistes en augmentant votre décompte de CD4.

COMMENT prendre le Triumeq®?

- 1 comprimé de Triumeq® par voie orale 1 fois par jour.
- Avec ou sans nourriture.

Notes importantes :

- Prenez le Triumeq® tel que prescrit pour s'assurer qu'il soit aussi efficace et sécuritaire que possible.
- Ne JAMAIS ajuster la dose par vous même et ne pas sauter de doses car:
 - Trop peu de médicament peut diminuer l'efficacité du Triumeq® et augmenter le risque de résistance au traitement (quand le médicament ne fonctionne plus contre le virus).
 - Trop de médicament augmente le risque d'effets secondaires.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

- La prendre dès que possible.
- Si vous vous en rappelez seulement dans les 4 heures précédant votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et poursuivez le traitement selon votre horaire régulier.
- Ne jamais doubler la dose

Quels sont les EFFETS SECONDAIRES du Triumeq®? Que devriez-vous faire?

Le Triumeq® est généralement bien toléré.

Les effets secondaires plus communs sont:

- troubles d'estomac (ex: nausée, diarrhée)
- maux de tête, étourdissements
- insomnie/rêves anormaux
- fatigue/manque d'énergie

Ces effets sont habituellement légers et disparaissent après le premier mois de traitement. Si ces effets indésirables sont trop inconfortables et persistants, parlez en avec votre médecin ou pharmacien.

Effets secondaires moins communs, mais potentiellement plus sérieux:

- Éruption cutanée
- Signes d'atteinte hépatique:
 - augmentation des enzymes hépatiques
 - jaunissement des yeux ou la peau
 - selles pâles, urine foncée
 - douleur sous les côtes droites
- Crampes abdominales sévères avec vomissement qui peuvent être causés par une inflammation du pancréas.
- Réaction allergique au dolutégravir

Les tests sanguins sont faits régulièrement pour dépister ces effets indésirables.

Il est important de vous rendre à vos rendez-vous médicaux et vos tests de sang pour que votre progression soit suivie.

Rarement, une réaction allergique sévère, appelée **RÉACTION D'HYPERSENSIBILITÉ**, peut se produire à cause de la composante **abacavir du Triumeq®**.

- Des avancées technologiques permettent d'identifier les personnes à risque d'avoir cette réaction en vérifiant un gène appelé HLA B5701. Si vous êtes HLA B5701 positif, vous êtes à risque d'avoir une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir et vous ne devriez **PAS** en prendre. Très rarement, certaines personnes HLA B5701 négatifs peuvent avoir cette réaction.
- **Les symptômes d'hypersensibilité peuvent inclure: éruption cutanée, symptômes pseudo-grippaux (fièvre, fatigue, douleur musculaire/ articulaire), mal de gorge, toux, nausée, vomissement, diarrhée, essoufflement, enflure du visage.**
- **Avisez votre médecin immédiatement si vous développez un rash cutané ou 2 autres symptômes listés ci-dessus.** Vous aurez besoin d'être évalué et le traitement pourrait être cessé.
- Si vous avez eu une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir dans le passé, vous ne devez **JAMAIS** reprendre l'abacavir, puisqu'une réaction potentiellement mortelle peut survenir.

Quelles sont les autres PRÉCAUTIONS à prendre lors de la prise du médicament?

- Informez les professionnels de la santé de tout médicament sous prescription, en vente libre, produit de santé naturel ou drogue récréative (drogue de rue) que vous prenez. Lors de l'initiation d'un nouveau médicament, demandez à votre pharmacien de vérifier les interactions.

Interactions médicamenteuses

Ne prenez PAS de dofetilide (Tykosyn®) avec le Triumeq®.

Autres médicaments qui peuvent interagir avec le Triumeq® :

- Metformine (pour traiter le diabète)
- Anticonvulsivants (carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital, phénytoïne)
- Millepertuis
- Rifampine
- Les antiacides et suppléments contenant du **calcium, magnésium, fer ou aluminium peuvent interférer avec l'absorption du dolutégravir.**
 - Si vous prenez le Triumeq en mangeant, vous pouvez prendre des suppléments de calcium et fer en même temps.
 - Sinon, prenez le Triumeq au moins 2h avant et 6h après la prise d'antiacides et/ou suppléments de calcium ou fer.

Comment CONSERVER le Triumeq®?

Le Triumeq® devrait être conservé à température pièce (jusqu'à 30°C) à l'abri de la lumière. Ne pas conserver dans un endroit humide (salle de bain, cuisine).

- Garder hors de la portée des enfants.
- S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption («EXP»).

Références:

Viiv Healthcare ULC. Product Monograph Triumeq® (dolutegravir/abacavir/lamivudine). Laval, QC. Canada: 4 juin 2015.
Song et al. J Clin Pharmacol. 2015;55(5):490-6.

Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, Novembre 2015. Traduction française par Tina Houch & Benoît Lemire, Centre universitaire de santé McGill.

Fiches médicamenteuses additionnelles et mises à jour disponibles au: www.hivclinic.ca

DOLUTEGRAVIR
+
ABACAVIR
+
LAMIVUDINE
(TRIUMEQ®)

FICHE
MÉDICAMENTEUSE