

ABACAVIR

Autre NOM : Ziagen®

L'abacavir fait également partie des produits d'association suivants :

- Kivexa® (abacavir/lamivudine)
- Trizivir® (abacavir/lamivudine/zidovudine)

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

L'abacavir est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Il est utilisé avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺) et vous serez mieux protégé contre les infections.

L'abacavir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration d'abacavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose habituelle est de 300 mg deux fois par jour ou de 600 mg une fois par jour. Ce médicament peut être pris avec ou sans aliments.

Voici votre posologie :

comprimé à 300 mg :

___ comprimé (___ mg) ___ fois par jour

ou

solution orale à 20 mg/ml :

___ ml (___ mg) ___ fois par jour

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose d'abacavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses d'abacavir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que l'abacavir cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à l'abacavir peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses d'abacavir peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre l'abacavir sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

La plupart des effets indésirables signalés sont légers et peuvent comprendre : nausées, maux de tête, douleurs musculaires ou perte d'énergie.

Rarement, une réaction grave appelée **RÉACTION D'HYPERSENSIBILITÉ** peut survenir avec l'abacavir (chez 4 % des patients). Cette réaction survient généralement au cours des 6 premières semaines du traitement avec l'abacavir. De nombreuses personnes, mais pas

toutes, vont présenter une **éruption cutanée**. Cette réaction peut aussi comprendre des **symptômes pseudo-grippaux, tels que la fièvre, des frissons, des douleurs musculaires et articulaires, la fatigue et une sensation générale de malaise. Les autres symptômes pouvant accompagner cette réaction sont : nausées, vomissements, diarrhée, plaies dans la bouche, ampoules sur la peau, enflure du cou, des yeux et de la langue, rougeur des yeux, essoufflement, toux, mal de gorge et tension artérielle basse.**

Avisez votre médecin immédiatement si vous présentez une éruption cutanée ou deux des autres symptômes mentionnés ci-dessus lorsque vous prenez l'abacavir. Vous devrez être évalué et vous devrez peut-être arrêter définitivement de prendre le médicament. **Si l'on vous dit d'arrêter de prendre l'abacavir, vous ne devez plus JAMAIS prendre l'abacavir, car il pourrait provoquer une réaction mettant votre vie en danger. De même, vous ne devez JAMAIS prendre Trizivir® ou Kivexa®, car ces médicaments contiennent aussi de l'abacavir.**

Si vous ne pouvez pas joindre votre médecin ou votre pharmacien, vous pouvez appeler la ligne de soutien canadienne pour Ziagen®. C'est une ligne d'assistance téléphonique 24 heures, bilingue et sans frais. Le numéro de téléphone est le 1 800 868-8898.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses d'abacavir plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses d'abacavir plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à l'abacavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'abacavir. L'abacavir peut également avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Veillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est pas recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

L'abacavir doit être conservé dans un endroit sec et frais (2 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver le produit dans la salle de bains ni la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

ABACAVIR

FEUILLET DE

RENSEIGNEMENTS

Référence : Monographie de produit Ziagen® (abacavir). Mississauga (Ontario), Canada : GlaxoSmithKline, 2008. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2005. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca