

ACYCLOVIR

Autre nom : Zovirax®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'acyclovir est un agent antiviral utilisé pour traiter les infections telles que l'herpès (HSV-1 et HSV-2), le zona et la varicelle. L'herpès provoque de petites ampoules remplies de liquide qui deviennent des ulcères pouvant être douloureux et causer des démangeaisons. Ces ampoules contiennent plusieurs particules infectieuses du virus de l'herpès. L'acyclovir empêche le virus de se propager, réduisant le nombre d'ampoules douloureuses et accélère la guérison. Si vous commencez à prendre l'acyclovir aussitôt que vous sentez le début d'une infection, il peut être possible d'empêcher les ampoules de se former. Il peut également être utilisé dans la prévention des infections récurrentes d'herpès génital.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'acyclovir est présenté sous forme de comprimés à 200, 400 et 800 mg ainsi que sous forme de liquide à saveur de banane. La dose recommandée d'acyclovir variera selon le traitement prescrit par votre médecin.

La dose recommandée pour traiter le premier épisode d'herpès génital est de 200 mg cinq fois par jour ou 400 mg trois fois par jour pendant 10 jours. Le traitement devrait être instauré aussitôt que possible après l'apparition des signes et des symptômes.

La dose recommandée pour prévenir les infections récurrentes est de 200 mg trois fois par jour ou 400 mg deux fois par jour. Cette dose peut être augmentée au besoin afin de prévenir la multiplication du virus.

La dose devra être ajustée si vous avez des problèmes aux reins.

Votre dose est :

- comprimé à 200 mg
- comprimé à 400 mg
- comprimé à 800 mg

___ comprimé (___ mg) ___ fois par jour

ou

- solution orale de 40 mg / mL

___ mL (___ mg) ___ fois par jour

Vous pouvez prendre l'acyclovir avec ou sans nourriture. Avalez chaque comprimé avec de l'eau. Ne pas le mâcher. Il est important de prendre tous les comprimés qui vous ont été prescrits même si vous commencez à vous sentir mieux.

Pour le traitement de l'herpès génital, il existe une crème et un onguent. La crème ou l'onguent doit être appliqué sur la région infectée 4 à 6 fois par jour pendant 10 jours. Le produit doit être appliqué de façon à couvrir toutes les lésions. Un gant en caoutchouc ou un protège-doigt devrait être utilisé lorsque vous appliquez le produit afin d'empêcher le virus de se propager ou d'infecter une autre personne. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les yeux ni dans les muqueuses (dans la bouche, le nez).

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'acyclovir, prenez-la dès que possible, puis continuez de prendre votre médicament selon la dose habituelle. Si vous vous souvenez que vous avez oublié une dose 2 heures avant de prendre votre prochaine dose, ne doublez pas la dose. Prenez tout simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables ?

L'acyclovir est généralement bien toléré. Des **nausées, vomissements, diarrhée, étourdissements ou maux de tête** peuvent se produire. Si ces effets se produisent et qu'ils sont inconfortables, veuillez en aviser votre médecin ou votre pharmacien. Communiquez immédiatement avec votre médecin si vous avez des effets indésirables comme des **bleus** ou des **saignements inhabituels** ou si vous pensez que vous faites une **réaction allergique (plaques rouges sur la peau)** à l'acyclovir.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres précautions devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Les infections herpétiques provoquent des ampoules douloureuses sur la peau. Le liquide de ces ampoules contient le virus causant la maladie. Les infections peuvent facilement se propager. Si vous touchez vos ulcères sur la peau, lavez-vous les mains immédiatement. Évitez tout contact intime avec d'autres personnes lorsque la maladie est visible.

Mentionnez à votre médecin si vous avez eu une réaction allergique ou un effet indésirable à d'autres agents antiviraux comme le valacyclovir (Valtrex®), le famciclovir (Famvir®), le ganciclovir (Cytovene®), ou le valganciclovir (Valcyte^{MC}).

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'acyclovir. L'acyclovir peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre

pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est important de leur dire si vous prenez du probénécide (Benemid®), de la cimétidine (Tagamet®), des stéroïdes (p. ex. la prednisone) ou tout médicament anticancéreux avant de commencer à prendre l'acyclovir.

Puisque l'acyclovir est éliminé par les reins, il est important d'aviser votre médecin si vous avez des problèmes aux reins avant de prendre ce médicament. N'oubliez pas de mentionner également à votre médecin si vous avez le VIH, le SIDA ou toute maladie de la moelle osseuse.

La sécurité de l'acyclovir n'a pas été établie durant la grossesse ou l'allaitement. Veuillez discuter de vos préoccupations à ce sujet avec votre médecin ou votre pharmacien.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

L'acyclovir devrait être entreposé dans un endroit frais (15-25 °C) et sec, protégé de la lumière et hors de la portée des enfants. Ne pas garder dans la salle de bains ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

ACYCLOVIR

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***

Référence : Monographie de Zovirax® Oral (Acyclovir). St-Laurent, Qc, Canada : GlaxoSmithKline, 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.tthhivclinic.com