

# ATAZANAVIR

**Autres NOMS :** BMS-232632, Reyataz<sup>MC</sup>

## POURQUOI prescrit-on ce médicament?

L'atazanavir est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des **inhibiteurs de la protéase**. Les inhibiteurs de la protéase agissent à une étape de la reproduction du virus différente de celle des autres catégories de médicaments disponibles auparavant pour combattre le VIH. L'atazanavir est utilisé avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4<sup>+</sup>) et vous serez mieux protégé contre les infections.

L'atazanavir ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de l'atazanavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT doit-on prendre ce médicament?

L'atazanavir est présenté en gélules à 100, 150, 200 et 300 mg. La dose recommandée d'atazanavir est de 400 mg une fois par jour, ou de 300 mg une fois par jour avec du ritonavir à 100 mg une fois par jour. Selon les autres médicaments que vous prenez, la dose d'atazanavir devra peut-être être ajustée.

Voici votre posologie :

- gélule à 100 mg
- gélule à 150 mg
- gélule à 200 mg
- gélule à 300 mg

\_\_\_ gélules (\_\_\_ mg) une fois par jour

Il est préférable de prendre l'atazanavir avec de la nourriture pour obtenir une meilleure absorption et pour éviter les maux d'estomac.

Avaler les gélules entières sans les mâcher, avec un peu d'eau ou une boisson non alcoolisée. Vous devez éviter la consommation excessive d'alcool pendant votre traitement.

## Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose d'atazanavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses d'atazanavir, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que l'atazanavir cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à l'atazanavir peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses d'atazanavir peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devez toujours prendre vos doses d'atazanavir. Ne cessez pas de prendre l'atazanavir sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

Les effets indésirables les plus fréquents sont : **faiblesse ou fatigue, nausées, diarrhée, étourdissements, fièvre, maux de tête, douleur abdominale, sensation de picotement ou engourdissement dans les mains, les pieds et autour des lèvres.** Si ces effets se produisent et vous incommode, veuillez appeler la clinique ou en parler lors de votre prochaine visite.

À l'occasion, **un jaunissement de la peau ou des yeux** peut se produire. Ces effets peuvent être dus à une augmentation du taux de bilirubine dans votre sang. Bien que ces effets ne puissent pas endommager le foie, la peau ou les yeux, il est important de les mentionner sans attendre à votre professionnel de la santé s'ils se produisent.

Rarement, certaines personnes peuvent présenter une éruption cutanée. Si cela se produit, veuillez consulter votre médecin.

Des tests sanguins seront effectués régulièrement pour déceler tout changement dans la fonction de votre foie ou de votre pancréas. En particulier, il se peut que vos taux de bilirubine ou de glycémie augmentent. Bien que l'atazanavir ait peu d'influence sur les taux de cholestérol et de triglycérides, votre médecin les vérifiera probablement.

On ne connaît pas les effets à long terme de l'atazanavir pour l'instant. Une prise de poids anormale ou des changements dans la forme du corps ont été signalés avec d'autres inhibiteurs de la protéase. D'autres études sont en cours pour déterminer si l'atazanavir peut causer ces effets.

**Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.**

## Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses d'atazanavir plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses d'atazanavir plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à l'atazanavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'atazanavir. L'atazanavir peut également avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

**Les médicaments suivants ne doivent pas être pris avec l'atazanavir :**

- Astémizole (Hismanal<sup>®</sup>)
- Cisapride (Prepulsid<sup>®</sup>)
- Dérivés de l'ergot de seigle (ergotamine [Cafergot<sup>®</sup>, Bellergal<sup>®</sup>, Ergodryl<sup>MC</sup>, Gravergol<sup>®</sup>], ergonovine, dihydroergotamine [Migranal<sup>MD</sup>], méthylergonovine [Methergine<sup>®</sup>])
- Midazolam (Versed<sup>®</sup>)
- Oméprazole (Losec<sup>®</sup>), lansoprazole (Prevacid<sup>®</sup>), pantoprazole (Pantoloc<sup>®</sup>), rabéprazole (Pariet<sup>MC</sup>), ésoméprazole (Nexium<sup>®</sup>)
- Pimozide (Orap<sup>®</sup>)
- Rifampine (p. ex., Rifadin<sup>®</sup>, Rimactane<sup>®</sup>, Rofact<sup>®</sup>)
- Triazolam (Halcion<sup>®</sup>)
- Terfénadine (Seldane<sup>®</sup>)
- Voriconazole (Vfend<sup>MC</sup>)

Veillez prévenir votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments mentionnés ci-dessus pour qu'il puisse vous prescrire un autre médicament.

L'atazanavir ne doit pas être pris en même temps que des antiacides comme TUMS<sup>®</sup>, Rolaid<sup>®</sup>, Maalox<sup>®</sup>, etc. Si vous devez prendre ces médicaments, prenez-les 1 heure avant ou 2 heures après l'atazanavir.

De plus, les anti-ulcéreux comme la ranitidine (Zantac<sup>®</sup>), la famotidine (Pepcid<sup>®</sup>), l'oméprazole (Losec<sup>®</sup>), le lansoprazole (Prevacid<sup>®</sup>), le pantoprazole (Pantoloc<sup>®</sup>), le rabéprazole (Pariet<sup>MC</sup>) et l'ésooméprazole (Nexium<sup>®</sup>) peuvent diminuer l'absorption et l'activité de l'atazanavir. Si vous prenez un de ces médicaments, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

L'innocuité de l'atazanavir pendant la grossesse et l'allaitement n'a pas été établie. Veuillez aviser votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

L'atazanavir doit être conservé dans un endroit sec et frais (15 à 25 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. La poudre pour dispersion orale d'atazanavir doit être protégée de l'humidité.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver le produit dans des endroits chauds et humides (p. ex., dans la salle de bain ou près de la cuisinière), car le médicament peut devenir moins efficace.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.**

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

**Pharmacien(ne) :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie d'atazanavir (Reyataz<sup>MC</sup>). Bristol-Myers Squibb, Montréal, Canada, 2009. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2004. Mise à jour 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca).

**ATAZANAVIR**

**FEUILLET DE**

**RENSEIGNEMENTS**