

CASPOFUNGINE

Autre NOM : Cancidas®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La caspofungine est un médicament utilisé pour traiter diverses infections fongiques, dont celles causées par candida [infections buccales (muguet) ou œsophagiennes] ou par aspergillose.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La caspofungine est administrée uniquement par voie intraveineuse (dans les veines). Elle est administrée lentement pendant au moins une heure. La dose recommandée est de 70 mg la première journée, suivi de 50 à 70 mg une fois par jour pour le reste du traitement.

Votre dose est la suivante :

Jour 1 :
___mL (___mg) une fois par jour, puis

Jour 2 et par la suite :
___mL (___mg) une fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

La caspofungine sera sans doute administrée par une infirmière à la clinique. Veuillez vous présenter à tous vos rendez-vous pour recevoir votre dose de caspofungine. Si vous sautez une dose de caspofungine, votre infection fongique pourrait réapparaître ou s'aggraver. Si vous ne vous êtes pas présenté à votre rendez-vous, communiquez immédiatement

avec la clinique pour prendre un autre rendez-vous et recevoir votre dose dès que possible.

Si vous recevez vos doses de caspofungine à domicile et que vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre des doses de caspofungine, votre infection peut persister ou s'aggraver. Le cas échéant, vous devrez peut-être prendre d'autres médicaments. Il est donc très important de prendre la caspofungine pendant tout le traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La caspofungine est habituellement bien tolérée. Certaines personnes peuvent présenter les effets indésirables suivants : fièvre, douleur et enflure au site d'injection, nausée, vomissements et mal de tête. Durant la perfusion intraveineuse, des symptômes tels qu'une sensation de chaleur, une enflure au visage, une éruption cutanée (plaques rouges sur la peau) et des démangeaisons peuvent survenir. Veuillez consulter un médecin immédiatement si vous avez une éruption cutanée.

Chez les patients recevant déjà de la cyclosporine, (Neoral®, Sandimmune®), la caspofungine peut causer l'augmentation

des enzymes du foie, lesquels seront vérifiés par des prises de sang.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre la caspofungine, vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous avez déjà eu une réaction allergique à ce médicament. Informez également votre médecin si vous avez des antécédents de maladie du foie. Si vous avez des troubles du foie, il pourrait être nécessaire de diminuer votre dose.

De nombreux médicaments peuvent influencer l'effet de la caspofungine. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Veuillez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants :

- Carbamazépine (Tegretol®)
- Cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®)

- Dexaméthasone (Dexasone®)
- Efavirenz (Sustiva®)
- Nelfinavir (Viracept®)
- Névirapine (Viramune®)
- Phénytoïne (Dilantin^{MC})
- Rifampine (Rifadin®, Rimactane®, Rofact^{MC})

La sécurité de la caspofungine durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été déterminée. Veuillez en discuter avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet. L'allaitement n'est pas recommandé si vous avez une infection par le VIH car vous pourriez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Une fois la caspofungine diluée, la solution reste stable pendant 24 heures à la température de la pièce (15 à 25 °C) ou pendant 48 heures si elle est gardée au réfrigérateur (2 à 8 °C). Garder les sacs dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants.

Environ une heure avant le traitement, prenez un sac du réfrigérateur et laissez-le réchauffer à la température de la pièce. Vérifier qu'il n'y ait aucune fuite et qu'il n'y ait aucune particule solide dans la solution. La solution devrait être transparente et incolore. Si ce n'est pas le cas, vous ne devriez pas utiliser ce sac.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Cancidas® (caspofungine). Whitehouse Station, NJ, USA: Merck & Co., Inc., 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

CASPOFUNGINE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***