

CIPROFLOXACINE

Autre NOM : Cipro®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La ciprofloxacine est un agent antibactérien utilisé pour traiter diverses infections, dont le complexe Mycobacterium avium (MAC).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Ce médicament est habituellement administré en association avec d'autres agents pour traiter le MAC. La dose de ciprofloxacine est de 500 à 750 mg deux fois par jour. Si la ciprofloxacine est prescrite pour traiter une autre infection, la dose peut être différente. Il se peut aussi que la dose soit diminuée si vous avez des troubles aux reins.

Prenez la ciprofloxacine avant ou après les repas avec beaucoup d'eau, et buvez plusieurs verres d'eau durant la journée. Ne prenez pas la ciprofloxacine avec des produits laitiers.

Votre dose est la suivante :

- comprimé à 250 mg
- comprimé à 500 mg
- comprimé à 750 mg

___ comprimé(s) (___ mg) ___ fois par jour

ou

- suspension orale à 100 mg / mL :

___ mL (___ mg) ___ fois par jour

Bien agiter le flacon avant chaque usage

La ciprofloxacine doit être prise régulièrement pour être efficace et prévenir une résistance médicamenteuse. Prenez toutes les doses même si vous commencez à vous sentir mieux.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de ciprofloxacine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

En général, la ciprofloxacine est bien tolérée. Moins de 5 % des personnes souffrent de : **nausée, malaises d'estomac, diarrhée, étourdissements, somnolence, insomnie, sensation de tête légère, mal de tête et agitation**. Assurez-vous de savoir comment vous réagissez à ce médicament avant de conduire une voiture, faire fonctionner des machines ou faire toute activité qui pourrait être dangereuse en cas d'étourdissement, somnolence ou sensation de tête légère. Si ces effets surviennent et sont inconfortables, veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien.

Très rarement, des effets indésirables plus graves peuvent survenir. Consultez immédiatement un médecin si vous avez les symptômes suivants : éruption cutanée (plaques rouges sur la peau) avec démangeaisons, uricairie ou autre maladie de la peau, fièvre, enflure du visage, des lèvres, de la bouche ou de la gorge pouvant causer une difficulté à avaler ou à respirer, teinte jaune de la peau et dans les yeux (jaunisse), vomissements et douleur abdominale graves, sang dans l'urine, changement de l'audition, de la vision ou

du goût, battements de cœur irréguliers, enflure des mains, des pieds ou des chevilles, tremblements, hallucinations ou convulsions.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre la ciprofloxacine, avisez votre médecin si vous avez des troubles aux reins ou avez déjà eu une réaction allergique à la ciprofloxacine.

Vous ne devriez PAS prendre de ciprofloxacine si vous êtes enceinte, sauf si votre médecin juge que les bienfaits l'emportent sur les risques. Veuillez discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet. Vous ne devriez PAS non plus allaiter si vous prenez de la ciprofloxacine.

Certaines personnes prenant de la ciprofloxacine peuvent être plus sensibles à la lumière du soleil. Évitez la lumière directe du soleil autant que possible. Portez des vêtements de protection, dont un chapeau et des verres fumés. Utilisez un écran solaire avec un FPS d'au moins 15. N'utilisez pas de lampe solaire ni de lit de bronzage. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des questions à ce sujet.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la ciprofloxacine. Cette dernière peut aussi influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des

produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

La ciprofloxacine peut affecter la manière dont la caféine est éliminée de l'organisme. Il faut donc éviter des quantités excessives de café, thé, et boissons gazeuses brunes pendant le traitement par ciprofloxacine. Les antiacides utilisés pour traiter les troubles d'estomac (Amphogel®, Maalox®), les suppléments de calcium et de fer, et la didanosine (Videx^{MC}) peuvent influencer l'absorption de la ciprofloxacine. Si vous devez prendre ces médicaments, veuillez les prendre au moins 2 heures après la dose de ciprofloxacine.

La ciprofloxacine peut aussi influencer l'effet des médicaments suivants :

- cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®)
- glyburide (Diabeta®)
- probénécide (Benuryl^{MC})
- sucralfate (Sulcrate®)
- théophylline (Theo-Dur®, Uniphyl®, Quibron®)
- warfarine (Coumadin®)

Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un des ces médicaments.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés de ciprofloxacine doivent être conservés dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière. La suspension orale de ciprofloxacine doit être gardée entre 5 et 25 °C. La suspension peut être conservée pendant 14 jours après sa préparation. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur

l'emballage. Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Cipro® (ciprofloxacine). Toronto, ON, Canada : Bayer Inc., 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

CIPROFLOXACINE

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS