

CO-TRIMOXAZOLE

Autres NOMS : Septra®, Bactrim®, triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX)

Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous avez déjà eu une réaction au sulfa.

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le co-trimoxazole est l'association de deux antibiotiques utilisés pour prévenir ou traiter la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC). Il est également utilisé pour prévenir d'autres infections telles que la toxoplasmose (infection grave du cerveau).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le co-trimoxazole est offert sous forme de comprimé à simple teneur, rond et blanc, et de comprimé à double teneur, plus gros et en forme de ballon de football. Assurez-vous de prendre les comprimés appropriés pour votre dose. Si vous avez de la difficulté à avaler les comprimés, le médicament est aussi offert sous forme de liquide.

Pour prévenir la PPC et la toxoplasmose, la dose habituelle est de 1 comprimé à simple teneur ou 1 comprimé à double teneur une fois par jour. Il peut aussi être prescrit seulement 3 jours par semaine. Pour le traitement de la PPC, le co-trimoxazole peut être administré par voie orale 3-4 fois par jour ou par injection intraveineuse (dans les cas plus graves).

Vous devriez prendre votre dose de co-trimoxazole avec un grand verre d'eau. Ce médicament peut être pris avec de la nourriture ou non. En cas de malaise à l'estomac, le prendre avec de la nourriture.

Votre dose est la suivante:

comprimé à simple teneur
(80 mg TMP / 400 mg SMX)

comprimé à double teneur
(160 mg TMP / 800 mg SMX)

___co. (___mg TMP) ___fois par jour
___jours par semaine

ou

suspension orale à 8 mg/mL TMP + 40 mg/mL SMX
___mL (___mg TMP) ___fois par jour
___jours par semaine

Bien agiter la suspension

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de co-trimoxazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de co-trimoxazole, le risque d'infections graves telles que la PPC et la toxoplasmose peut augmenter. Si vous prenez du co-trimoxazole pour traiter une PPC active, votre infection pourrait s'aggraver si vous ne prenez pas le traitement complet. Le cas échéant, vous devrez peut-être prendre d'autres médicaments. Il est donc très important de prendre le co-trimoxazole pendant la période complète du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les allergies au co-trimoxazole sont très courantes chez les personnes infectées par le VIH. Une allergie se manifeste habituellement sous forme de **fièvre avec ou sans éruptions cutanées (plaques rouges sur la peau) et démangeaisons**. Le cas échéant,

communiquez immédiatement avec votre médecin. Si vous ne tolérez pas le co-trimoxazole, il existe d'autres médicaments pour prévenir la PPC et la toxoplasmose et pour traiter la PPC. Votre médecin peut décider aussi d'essayer de nouveau le co-trimoxazole en augmentant la dose très lentement (désensibilisation).

Une diminution du nombre de globules blancs (pour combattre les infections), **du nombre de globules rouges** (pour transporter l'oxygène dans l'organisme) et **des plaquettes** (pour favoriser la coagulation du sang) peut également survenir. Habituellement, ces effets ne sont pas assez sévères pour justifier l'arrêt du traitement. Vous devez vous présenter à vos rendez-vous pour vos tests sanguins réguliers qui permettront de vérifier tout changement de ces valeurs. Avisez votre médecin si vous présentez des symptômes tels que fièvre, frissons, essoufflement, battements du cœur rapides, fatigue, saignement ou bleus.

Les nausées, les vomissements, la douleur abdominale ou la diarrhée ne sont pas communs. Si ces effets surviennent, prenez le médicament avec de la nourriture. Consultez votre médecin si ces effets deviennent inconfortables.

Le co-trimoxazole peut causer **des augmentations des enzymes du foie**, lesquels seront vérifiés par des tests sanguins.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre le co-trimoxazole, avisez votre médecin si vous êtes allergique à ce médicament ou au sulfa, ou si vous avez déjà eu des troubles au foie ou au reins.

Si vous prenez du co-trimoxazole, il se peut que votre peau soit plus sensible à la lumière du soleil ou aux lampes solaires. Vous devriez donc porter des vêtements de protection et utiliser un écran solaire avec un FPS d'au moins 15 lorsque vous êtes exposé au soleil. Vous devriez éviter les lampes solaires. Demandez conseil à votre pharmacien pour choisir un écran solaire qui vous protégera contre les réactions médicamenteuses au soleil.

Le co-trimoxazole peut influencer l'effet de certains médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants :

- Cyclosporine(Neoral®,
Sandimmune®)
- Digoxine (Lanoxin®)
- Méthotrexate
- Phénytoïne (Dilantin^{MC})
- Pyriméthamine (Daraprim®)
- Warfarine (Coumadin®)
- Zidovudine (Retrovir®)

La sécurité du co-trimoxazole durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été déterminée. Veuillez en discuter avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet. L'allaitement n'est pas recommandé si vous avez une infection

par le VIH car vous pourriez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés et la suspension orale de co-trimoxazole doivent être gardés dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage. Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière. Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Septra® (triméthoprimé - sulfaméthoxazole). Saint-Laurent, Qc, Canada : GlaxoSmithKline, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

COTRIMOXAZOLE

***(TRIMÉTHOPRIME-
SULFAMÉTHOXAZOLE)***

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS