

DELAVIRDINE

Autre NOM : Rescriptor®

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

La delavirdine est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Elle est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺) et vous serez mieux protégé contre les infections.

La delavirdine ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, elle aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de delavirdine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose habituelle de delavirdine est de 400 mg (4 comprimés) trois fois par jour ou de 600 mg (6 comprimés) deux fois par jour. La delavirdine peut être prise avec ou sans nourriture.

Les comprimés de delavirdine doivent être avalés entiers avec de l'eau. Si vous avez de la difficulté à avaler les comprimés, vous pouvez les faire dissoudre dans un verre d'eau. Lorsqu'ils sont dissous, mélanger l'eau puis boire. Rincez ensuite le verre avec un peu d'eau et boire pour être certain d'avoir pris toute la dose.

Voici votre posologie :

comprimé à 100 mg :

____ comprimés (____mg) ____ fois par jour

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de delavirdine, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de delavirdine, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que la delavirdine cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à la delavirdine peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses de delavirdine peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre la delavirdine sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

L'effet indésirable le plus couramment observé avec la delavirdine est une légère éruption cutanée. Avisez votre médecin si vous présentez une éruption cutanée pendant le traitement par la delavirdine. Dans la majorité des cas, cet effet peut être traité à l'aide d'anti-inflammatoires ou d'antihistaminiques. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un médicament pour traiter une éruption cutanée.

Si vous présentez une éruption cutanée grave ou une éruption cutanée accompagnée de symptômes tels que fièvre, ampoules sur la peau, plaies dans la bouche, rougeur des yeux, enflure, douleurs musculaires ou articulaires et sensation générale de malaise, **CESSEZ** de prendre la delavirdine. **Consultez immédiatement votre médecin.**

Les autres effets indésirables courants sont les maux de tête, les nausées, la diarrhée, la sédation et la fatigue. Des tests sanguins seront effectués pour vérifier tout changement de la fonction de votre foie.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses de delavirdine plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses de delavirdine plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à la delavirdine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la delavirdine. De plus, la delavirdine peut avoir une influence sur l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien de tous les médicaments que vous prenez, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les doses de certains médicaments auront peut-être besoin d'être diminuées si vous prenez de la delavirdine.

La delavirdine ne devrait pas être prise en même temps que des antiacides tels que TUMS[®], Rolaid[®], Maalox[®], etc. Vous devriez plutôt prendre la delavirdine une heure avant de prendre des antiacides.

De plus, des médicaments tels que la ranitidine (Zantac[®]), la famotidine (Pepcid[®]), l'oméprazole (Losec[®]), le lansoprazole (Prevacid[®]), le pantoprazole (Pantoloc[®]) et le rabéprazole (Pariet^{MC}) peuvent diminuer le taux d'absorption et l'activité de la delavirdine. Si vous prenez un de ces médicaments, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin.

La delavirdine ne doit **PAS** être prise avec les médicaments suivants :

- Midazolam (Versed[®])
- Pimozide (Orap[®])
- Triazolam (Halcion[®])

Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

La delavirdine doit être conservée dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver ce produit dans la salle de bains ni la cuisine, car la chaleur et l'humidité pourraient rendre le médicament moins efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

Référence : Monographie de Rescriptor[®] (delavirdine). Kirkland (Québec), Canada : Pfizer Canada Inc., 2003. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca

DELAVIRDINE

FEUILLET DE

RENSEIGNEMENTS