

DRONABINOL

Autres NOMS : Marinol®, delta – 9 - tétrahydrocannabinol

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le dronabinol est un narcotique utilisé pour traiter la nausée grave et les vomissements. Il fait partie d'une famille de médicaments nommés cannabinoïdes (p. ex., marijuana). On l'utilise aussi pour augmenter l'appétit et favoriser le gain de poids.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le dronabinol est offert sous forme de capsules à 2,5 mg, 5 mg et 10 mg. Pour augmenter l'appétit et favoriser le gain de poids, la dose initiale habituelle est de 2,5 mg deux fois par jour. En fonction des résultats obtenus, votre médecin peut décider d'augmenter la dose graduellement à 20 mg par jour. La dose peut varier si le dronabinol est utilisé pour traiter la nausée et les vomissements causés par la chimiothérapie.

Le dronabinol devrait être pris 1 heure avant le déjeuner et le dîner.

Votre dose est la suivante :

- capsule à 2,5 mg
- capsule à 5 mg
- capsule à 10 mg

___ capsule (___mg) ___ fois par jour

Le dronabinol peut être pris avec ou sans nourriture.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de dronabinol, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement le schéma posologique habituel.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Le dronabinol peut causer les effets indésirables suivants : **instabilité, étourdissements, difficulté de concentration, somnolence, euphorie, pensées anormales, fatigue, anxiété, confusion, hallucinations et paranoïa.** Des nausées, des vomissements, une douleur abdominale et une rougeur au visage peuvent aussi survenir.

Ces effets peuvent disparaître avec la poursuite du traitement à mesure que

votre organisme s'habitue au médicament. Avisez toutefois votre médecin si ces effets persistent ou deviennent incommodants.

Avisez **immédiatement** votre médecin si vous avez un rythme anormal ou rapide du cœur.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre le dronabinol, avisez votre médecin si vous avez déjà eu des effets indésirables avec le dronabinol, le nabilone (Cesamet®) ou la marijuana. Avisez aussi votre médecin si vous avez une allergie à l'huile de sésame, si vous avez une maladie du cœur (hypertension, rythme anormal du cœur, angine) ou des antécédents de troubles émotifs tels que dépression, maladie bipolaire (dépression maniaque) et schizophrénie (psychose, hallucinations).

Puisque ce médicament peut causer des étourdissements, une somnolence ou une perte de la vigilance chez certaines personnes,

vous ne devriez PAS conduire, faire fonctionner des machines, ni faire toute activité pouvant être dangereuse en cas d'étourdissements ou de perte de vigilance.

Le dronabinol peut accentuer les effets de divers médicaments ou substances. Par exemple, il peut accentuer les effets de l'alcool et d'autres déprimeurs du système nerveux central tels que les sédatifs, les relaxants musculaires, les narcotiques, les médicaments contre les convulsions et contre les allergies. Évitez de consommer de l'alcool lorsque vous prenez du dronabinol. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

La sécurité du dronabinol durant la grossesse et l'allaitement n'a pas encore été déterminée. D'ici à ce que plus d'information soit obtenue, vous ne devriez PAS prendre le dronabinol si vous êtes enceinte et vous devriez l'éviter si vous allaitez. Discutez avec votre médecin si vous avez des craintes à ce sujet.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Le dronabinol doit être gardé dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone : _____

Référence : Monographie de Marinol® (dronabinol). Markham, ON, Canada : Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

DRONABINOL

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***