

# ENFUVIRTIDE

**Autres NOMS :** T-20, Fuzeon®

## POURQUOI prescrit-on ce médicament?

L'enfuvirtide appartient à une nouvelle catégorie de médicaments appelés inhibiteurs de fusion. L'enfuvirtide est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui empêche le VIH de contaminer les cellules CD4.

L'enfuvirtide est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4<sup>+</sup>) et vous serez mieux protégé contre les infections.

L'enfuvirtide ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le VIH. Par contre, il aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration d'enfuvirtide ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose habituelle est de 90 mg (1,0 ml) en injection deux fois par jour sous la peau (idéalement toutes les 12 heures).

Voici votre posologie :

\_\_\_\_\_ ml (\_\_\_\_\_ mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

## COMMENT doit-on préparer ce médicament?

Le médicament est présenté en fiole de 108 mg. La poudre contenue dans chaque fiole doit être mélangée avec l'eau stérile pour injection fournie. Les directives pour mélanger la solution et l'injecter sont les suivantes :

- Poser les fournitures sur une surface propre.
- Se laver soigneusement les mains.
- Nettoyer les bouchons des fioles à l'aide d'un tampon imbibé d'alcool.
- Prélever 1,1 ml d'eau stérile à l'aide de la seringue munie d'un dispositif de sécurité et de l'aiguille.
- Injecter lentement l'eau stérile dans la fiole d'enfuvirtide en laissant l'eau couler sur la paroi de la fiole.
- Jeter l'aiguille dans un contenant pour objets contaminés.
- Mélanger la poudre d'enfuvirtide avec l'eau en faisant rouler la fiole ou en tapant légèrement dessus (ne PAS agiter la fiole); il faut environ 20 minutes pour dissoudre la poudre.
- Aspirer l'enfuvirtide pour l'injection à l'aide d'une nouvelle seringue munie d'un dispositif de sécurité et d'une nouvelle aiguille.
- Choisir un endroit sur le corps pour injecter le médicament (ne PAS choisir le même endroit que la dernière injection), puis injecter le médicament. L'injection doit être faite **sous la peau**, pas dans un muscle ni dans une veine.
- Jeter le matériel utilisé (aiguilles dans un contenant pour objets contaminés). **NE PAS RÉUTILISER LES AIGUILLES NI LES SERINGUES.**

## Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose d'enfuvirtide, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses d'enfuvirtide, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Si vous oubliez des doses d'enfuvirtide, le virus peut devenir résistant à l'enfuvirtide, c'est-à-dire que l'enfuvirtide peut cesser d'être efficace et d'autres antirétroviraux semblables à l'enfuvirtide peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses d'enfuvirtide peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devez toujours prendre vos doses d'enfuvirtide. Ne cessez pas de prendre l'enfuvirtide sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

L'effet indésirable le plus fréquent avec l'enfuvirtide est une réaction au point d'injection. La réaction sur la peau a un diamètre d'environ 2 cm (¾ po) et peut causer une sensibilité, une rougeur, une douleur, des démangeaisons ou une sensation de brûlure. Des bleus peuvent aussi apparaître. Ces réactions devraient s'atténuer après quelques jours. Mais il faut parfois 3 semaines pour qu'elles disparaissent complètement. Dans la plupart des cas, on peut continuer de prendre le médicament. Si vous présentez une réaction très douloureuse, vous devriez en parler à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien.

D'autres effets indésirables pouvant être associés à l'enfuvirtide comprennent : diarrhée, nausées, vomissements, étourdissements, troubles du sommeil, maux de tête, battements de cœur rapides, décoloration ou rougeur sur la peau, douleurs abdominales, faiblesse et fièvre. Des réactions graves ayant entraîné l'hospitalisation (p. ex., une pneumonie) ont rarement été observées.

**Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?**

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses d'enfuvirtide plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables. Si vous prenez des doses d'enfuvirtide plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à l'enfuvirtide.

L'enfuvirtide ne semble pas présenter un risque élevé d'interactions médicamenteuses. Par contre, la prise de certains médicaments n'est PAS autorisée et doit être évitée pendant le traitement par l'enfuvirtide.

Ces médicaments comprennent :

- Interleukine-2, interférons, Ampligen, vaccin anti-VIH, adéfovir (Preveon<sup>®</sup>), MKC-442, millepertuis et hydroxyurée

Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

L'innocuité de l'enfuvirtide pendant la grossesse n'a pas été établie. Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

**Comment doit-on CONSERVER ce médicament?**

L'ENFUVIRTIDE doit être conservé à température ambiante (4 à 20 °C), hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Une fois la poudre mélangée avec l'eau stérile pour injection, la solution reste stable pendant 24 heures au réfrigérateur.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.**

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

**Pharmacien(ne) :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Monographie de Fuzeon<sup>®</sup> (enfuvirtide). Mississauga (Ontario), Canada : Hoffmann-La Roche Ltée 2007. Préparé par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2005. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***ENFUVIRTIDE***

***FEUILLET DE***

***RENSEIGNEMENTS***