

ÉTHAMBUTOL

Autres NOMS : Etibi®, Myambutol®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'éthambutol est un antibiotique qui élimine les bactéries causant la tuberculose. Elle est généralement utilisée en association avec d'autres médicaments pour traiter la tuberculose et peut aussi être administrée pour traiter l'infection à complexe *mycobacterium avium* (MAC).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

L'éthambutol est offert sous forme de comprimés bleus à 100 ou à 400 mg. La dose est prise habituellement une fois par jour et est déterminée en fonction de votre poids. Il se peut que la dose soit ajustée si vous avez des troubles aux reins.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 100 mg

comprimé à 400 mg

___comprimé(s)(___mg)___fois
par jour

L'éthambutol peut être pris avec ou sans nourriture. Mais il peut être préférable de le prendre avec de la nourriture si vous avez des troubles d'estomac ou des nausées.

L'éthambutol doit être pris régulièrement pour être efficace ou prévenir la résistance au médicament. Prenez toutes vos doses même si vous commencez à vous sentir mieux.

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'éthambutol, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'éthambutol peut parfois causer des **nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des maux de tête, des étourdissements et une confusion**. Si ces effets sont incommodants, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

De rares cas de **troubles temporaires de la vision** ont été observés avec l'éthambutol. Votre vue peut diminuer ou devenir embrouillée et vous pourriez avoir des problèmes à voir les couleurs. Idéalement, votre vue devrait être examinée avant de commencer à prendre l'éthambutol et régulièrement pendant le traitement avec ce médicament. Avisez votre médecin si vous constatez des changements avec votre vue.

L'éthambutol cause rarement une **sensation de picotement ou d'engourdissement dans les mains ou les pieds**. Il peut aussi causer une douleur articulaire et augmenter le risque de goutte (dépôt d'acide urique dans les articulations) si vous êtes déjà prédisposé à ces problèmes. Avisez votre médecin si ces symptômes surviennent.

Votre médecin effectuera des tests sanguins réguliers pour vérifier votre sang, le taux d'acide urique, ainsi que la fonction de votre foie et de vos reins.

De rares cas de **réaction allergique** avec symptômes **d'éruption cutanée (plaques rouges sur la peau), de démangeaisons sur la peau et de fièvre** ont été observés. Avisez votre médecin si vous avez ces symptômes.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès. Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de prendre l'éthambutol, avisez votre médecin si vous avez déjà pris ce médicament par le passé et si vous aviez eu des effets indésirables tels qu'une réaction allergique ou des problèmes de la vue. Informez aussi votre médecin si vous avez des antécédents de goutte, de problèmes de vision, ou de maladie des reins ou du foie.

Ce médicament peut habituellement être administré sans danger avec d'autres médicaments. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

L'éthambutol peut généralement être administré sans danger durant la

grossesse ou l'allaitement. Avisez toutefois votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes enceinte ou allaitez

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

L'éthambutol doit être gardé dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Etibi® (éthambutol).
Montréal, Qc, Canada : ICN Canada Ltd., 2001. Préparé
par le *Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group*, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site: www.hivclinic.ca

ÉTHAMBUTOL

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***