

# GANCICLOVIR INTRAVEINEUX

**Autre NOM :** Cytovene® Injectable

## **POURQUOI ce médicament est-il prescrit?**

Le ganciclovir intraveineux (i.v.) est un antiviral utilisé comme traitement initial de l'infection à cytomégalo virus (CMV) (rétinite) et peut aussi être utilisé pour prévenir la rechute de l'infection à CMV après le traitement initial. Vous devriez faire examiner vos yeux régulièrement.

## **COMMENT ce médicament doit-il être pris?**

La dose habituelle de ganciclovir i.v. pour le traitement initial de l'infection à CMV est de 5 mg/kg aux 12 heures pendant 14 à 21 jours. Pour prévenir la rechute de l'infection à CMV, la dose habituelle est de 5 mg/kg une fois par jour tous les jours de la semaine, ou 6 mg/kg une fois par jour pendant 5 jours par semaine. Il se peut que la dose soit ajustée si vous avez des problèmes de reins.

Ce médicament devrait être administré par injection i.v. constante pendant au moins une heure.

Votre dose est la suivante :

\_\_\_\_ mg aux \_\_\_\_ heures pendant \_\_\_\_  
heure(s), \_\_\_\_ jours par semaine

Chaque dose de ganciclovir est présentée dans des sacs de 100 ou 250 mL. On devrait laisser réchauffer la solution i.v. à la température de la pièce avant l'administration en sortant la dose du réfrigérateur 30 minutes avant la perfusion de la dose. Essayez de prendre votre dose de ganciclovir à la même heure tous les jours.

Le ganciclovir vous sera remis par

## **Que faire si vous OUBLIEZ une dose?**

Si vous avez oublié de prendre une dose de ganciclovir, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement votre dose habituelle.

## **Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?**

L'effet indésirable le plus grave pouvant survenir avec le ganciclovir est une **diminution du nombre de globules blancs**, ce qui peut augmenter votre risque d'infections car les globules blancs servent à combattre les infections. Le ganciclovir peut aussi **diminuer le nombre de plaquettes** dans le sang, ce qui peut augmenter votre risque d'avoir des saignements ou des bleus car les plaquettes aident à coaguler le sang. Le **nombre de globules rouges pourrait aussi diminuer** ce qui pourrait causer une fatigue ou un essoufflement. Des tests sanguins seront effectués régulièrement pour détecter tout changement de ces valeurs. En cas de problèmes, votre dose de ganciclovir pourrait être réduite ou le médicament interrompu. Avisez votre médecin si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, essoufflement, battements de cœur rapides, fatigue, saignements ou bleus.

En cas de **confusion, sautes d'humeur, pensées ou rêves anormaux ou rougeurs (éruptions) sur la peau** durant le traitement par ganciclovir, avisez votre médecin ou votre pharmacien.

Des symptômes tels que **nausées, vomissements, diarrhée, fièvre, étourdissements ou maux de tête** peuvent survenir. Si ces effets se produisent et sont

incommodants, veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien.

**Une irritation (rougeur) ou une douleur** peut survenir au site d'injection (avant-bras) lorsque le ganciclovir est administré dans de petites veines du bras. On peut prévenir ce problème en ralentissant la perfusion, en changeant le point d'injection i.v. plus souvent ou en perfusant le médicament dans une veine centrale (à l'aide d'un cathéter veineux central Port-a-Cath ou Hickman).

Des tests sanguins seront effectués pour détecter tout changement de la fonction de votre foie ou de vos reins.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.**

## **Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?**

Évitez tout contact du médicament avec la peau, les yeux ou les muqueuses (nez). Portez des gants de caoutchouc pour nettoyer tout déversement. Si le médicament entre en contact avec votre peau ou des muqueuses, nettoyez la région à fond avec de l'eau et du savon, et rincez avec de l'eau.

Ne cessez pas de prendre ce médicament sans vérifier d'abord avec votre médecin, même si vous vous sentez bien. Maintenez vos visites régulières et avisez votre médecin de tout nouveau problème médical qui se manifeste pendant que vous prenez le ganciclovir.

Le ganciclovir peut causer une stérilité temporaire ou permanente chez les hommes et les femmes. Des malformations du fœtus se sont produites chez les animaux ; par conséquent, le ganciclovir n'est PAS recommandé pendant la grossesse, et les hommes et les femmes devraient utiliser un

moyen de contraception de barrière (comme des condoms) pendant le traitement et pendant 90 jours après la fin du traitement. On ne sait pas si le ganciclovir est excrété dans le lait maternel. En raison des malformations qui ont été observées chez les animaux traités par le ganciclovir, il est possible que les nourrissons allaités le soient également. Par conséquent, le ganciclovir ne doit PAS être administré aux mères qui allaitent. Veuillez discuter de vos préoccupations à ce sujet avec votre médecin ou votre pharmacien.

Mentionnez à votre médecin si vous avez eu une réaction allergique ou un effet indésirable à d'autres agents antiviraux comme l'acyclovir (Zovirax®), le valacyclovir (Valtrex®), le famciclovir (Famvir®) ou le valganciclovir (Valcyte<sup>MC</sup>).

Puisque le ganciclovir est éliminé par les reins, il est important d'aviser votre médecin si vous avez des troubles aux reins avant de prendre ce médicament.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du ganciclovir. Le ganciclovir peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est très important de leur dire si vous prenez du probénécide (Benemid®), de la didanosine (Videx<sup>MC</sup>), ou de la zidovudine (Retrovir®).

### **Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

La solution intraveineuse diluée de ganciclovir doit être gardée au réfrigérateur (2 – 8 °C). Il

est recommandé d'utiliser la solution dans les 24 heures suivant sa dilution. Garder hors de la portée des enfants.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Cytovene® (ganciclovir). Mississauga, On, Canada : Hoffmann-La Roche Limitée, 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuilles de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

## ***GANCICLOVIR INTRAVEINEUX***

### ***FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS***