

HYDROXYURÉE

Autre NOM : Hydrea®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'hydroxyurée est utilisée en association avec d'autres agents antirétroviraux (anti-VIH) de la catégorie des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) (p. ex., la didanosine/Videx^{MC}) pour accentuer l'action de ces médicaments. Elle n'entrave pas directement la reproduction du virus, mais réduit la quantité d'une substance nécessaire à la réplication du virus, permettant ainsi à d'autres médicaments d'entraver la reproduction du virus de façon plus efficace.

Lorsqu'elle est administrée en association avec d'autres médicaments, l'hydroxyurée ralentit la réplication du VIH et peut ainsi ralentir l'évolution de l'infection à VIH. Son administration ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Il est toujours possible de transmettre le VIH par contact sexuel, contact sanguin ou échange d'aiguilles. Vous devriez toujours utiliser les précautions appropriées pour éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La dose habituelle d'hydroxyurée est de 500 mg deux fois par jour. Elle peut être prise avec ou sans nourriture.

Si vous ne pouvez pas avaler les capsules, vous pouvez vider le contenu de la capsule dans un verre d'eau et le boire immédiatement. Évitez le contact de la

poudre avec votre peau ou vos yeux. Évitez aussi d'inhaler la poudre lorsque vous ouvrez la capsule. En cas de déversement, nettoyez immédiatement avec un linge humide jetable, puis jetez la capsule dans un contenant hermétique, comme un sac de plastique. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon.

Il est important de boire beaucoup d'eau lorsque vous prenez ce médicament pour réduire le risque d'avoir des problèmes de reins.

Votre dose est la suivante :

capsule à 500 mg

___ capsule (___ mg) ___ fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'hydroxyurée, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Les effets indésirables les plus couramment rapportés avec l'hydroxyurée sont : **diarrhée, nausées ou vomissements, ulcères dans la bouche, étourdissements, somnolence, perte d'appétit et maux de tête.** D'autres effets indésirables moins courants comprennent : constipation, légère perte de cheveux, rougeurs sur la peau (éruptions) ou démangeaisons, fièvre, frissons et une

sensation générale de malaise. Avisez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière si vous avez ces symptômes.

L'hydroxyurée peut **diminuer le nombre de globules blancs** de votre sang, ce qui peut augmenter le risque d'infections. Si vous avez de la fièvre, des frissons, une toux, une douleur dans le bas ou le côté du dos ou de la difficulté à uriner, communiquez avec votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

L'hydroxyurée peut aussi **diminuer le nombre de globules rouges** dans le sang. Les globules rouges transportent l'oxygène dans tout l'organisme. Si vous avez un essoufflement, une fatigue ou des battements de cœur rapides, avisez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

De plus, l'hydroxyurée peut **diminuer le nombre de plaquettes**, lesquelles jouent un rôle important dans la coagulation du sang. Si vous constatez des saignements ou des bleus inhabituels (p. ex., saignement du nez, selles noires ou foncées, sang dans l'urine ou saignements lorsque vous vous brossez les dents), avisez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre l'hydroxyurée, avisez votre médecin si vous avez une maladie aux reins.

L'hydroxyurée peut interférer avec d'autres médicaments que vous prenez. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est impératif d'aviser votre médecin si vous êtes enceinte, désirez le devenir ou allaitez. Vous ne devriez PAS prendre l'hydroxyurée dans de tels cas en raison du risque de malformation du fœtus. De plus, si vous êtes un homme et envisagez avoir des enfants, vous ne devriez PAS prendre l'hydroxyurée.

Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous devriez toujours utiliser des méthodes contraceptives appropriées (pilule contraceptive, condom) pour éviter la grossesse pendant le traitement par hydroxyurée. En général, même si vous ne prenez pas l'hydroxyurée, l'usage de condoms est toujours recommandé pour diminuer le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les capsules d'hydroxyurée sont sensibles à l'humidité et à la lumière. Garder dans un contenant hermétique à la température de la pièce (15 – 30 °C), hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Hydrea® (hydroxyurée).
Montréal, Qc, Canada : Squibb Canada Inc., 2002.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional
Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur
les médicaments peuvent être consultés au site :
www.hivclinic.ca

HYDROXYURÉE

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***