

NÉVIRAPINE

Autre NOM : Viramune®

POURQUOI prescrit-on ce médicament?

La névirapine est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui appartient à la catégorie des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Elle est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des cellules CD4⁺) et vous serez mieux protégé contre les infections.

La névirapine ne guérit pas le sida et ne tue pas complètement le virus. Par contre, elle aide à prévenir l'aggravation de l'état des patients en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de névirapine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Donc, il y a toujours un risque que vous transmettiez le VIH par contact sexuel, par le sang ou par le partage d'aiguilles. Vous devriez toujours prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT doit-on prendre ce médicament?

La dose habituelle est de 200 mg (1 comprimé) une fois par jour pendant 14 jours. La dose est ensuite augmentée à 200 mg (1 comprimé) deux fois par jour. Une dose plus faible est administrée durant les 14 premiers jours pour diminuer le risque d'éruption (rougeurs) sur la peau.

Voici votre posologie :

comprimé à 200 mg

Du __/__/__ au __/__/__

__ comprimé (___ mg) une fois par jour

ensuite, à compter du __/__/__, **augmenter** à

__ comprimé (___ mg) ___ fois par jour

La névirapine peut être prise avec ou sans nourriture. Les comprimés de névirapine doivent être avalés entiers avec un peu d'eau.

Que devez-vous faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez une dose de névirapine, prenez-la dès que possible. Cependant, si c'est l'heure de prendre la suivante, ne doublez pas la dose. Continuez plutôt de suivre votre horaire habituel.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez des doses de névirapine, la quantité de VIH dans votre sang (appelée charge virale) augmentera et votre système immunitaire sera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que la névirapine cesse d'être efficace. Il s'agit d'un phénomène appelé **résistance**. Lorsque cela se produit, d'autres antirétroviraux semblables à la névirapine **peuvent aussi devenir inefficaces**. **Par conséquent, le fait d'oublier des doses de névirapine peut diminuer le nombre d'options de traitement dans l'avenir.** Ne cessez pas de prendre la névirapine sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES ce médicament peut-il causer? Que devez-vous faire?

L'effet indésirable le plus couramment observé avec la névirapine est une légère éruption cutanée. Avisez votre médecin **immédiatement** si vous présentez une éruption cutanée pendant le traitement par la névirapine. **Si vous êtes une femme, le risque de lésions au foie est plus élevé. Dans certains cas, les lésions ont entraîné la mort. Le risque de lésions au foie est le plus élevé au cours des 6 premières semaines du traitement par la névirapine. Si vous présentez une éruption cutanée au cours des 14 premiers jours du traitement, n'augmentez pas la dose à deux fois par jour avant d'avoir consulté votre médecin.**

Si vous présentez des symptômes tels que : **fièvre, ampoules sur la peau, plaies dans la bouche, rougeur des yeux, enflure du visage, douleurs musculaires ou articulaires et sensation générale de malaise, CESSEZ** de prendre la névirapine. Consultez immédiatement votre médecin.

Les autres effets indésirables courants sont les maux de tête, les nausées, la diarrhée, la somnolence et la fatigue. Votre médecin fera régulièrement des tests sanguins pour déceler tout changement dans la fonction de votre foie.

Il est important de respecter vos rendez-vous avec le médecin et de vous présenter pour les analyses de laboratoire afin que l'on puisse suivre votre état de santé.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devez-vous prendre pendant que vous utilisez ce médicament?

Vous devez vous assurer de prendre la bonne dose. Si vous prenez des doses de névirapine plus élevées que ce qui vous a été prescrit, cela peut augmenter le risque d'effets indésirables.

Si vous prenez des doses de névirapine plus faibles que ce qui vous a été prescrit, il se peut que le VIH devienne résistant à la névirapine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la névirapine. De plus, la névirapine peut avoir une influence sur l'effet de plusieurs autres médicaments que vous prenez. Informez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments, qu'ils soient remis avec ou sans ordonnance. Vous devez aussi les informer des produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez d'abord consulter votre pharmacien.

Les doses de certains médicaments auront peut-être besoin d'être augmentées si vous prenez la névirapine.

L'efficacité des contraceptifs oraux ou d'autres hormones utilisées pour éviter la grossesse risque de diminuer si vous prenez la névirapine. Une deuxième méthode de contraception doit **toujours** être utilisée. En général, même si vous ne prenez pas de névirapine, l'emploi de condoms est toujours recommandé pour réduire le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infectée par le VIH, car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on CONSERVER ce médicament?

La névirapine doit être conservée dans un endroit sec et frais (15 à 30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas conserver ce produit dans la salle de bains ni la cuisine, car la chaleur et l'humidité pourraient rendre le médicament moins efficace.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous présentez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Notez vos questions ou préoccupations pour vous assurer qu'elles sont abordées.

Le pharmacien ou la pharmacienne ci-dessous est disponible pour répondre à vos questions :

Pharmacien(ne) : _____

Téléphone : _____

Référence : Monographie de Viramune® (névirapine). Burlington (Ontario), Canada : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2009. Préparé et mis à jour par l'Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2005. Révision 2009.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés sur le site : www.hivclinic.ca

NÉVIRAPINE

FEUILLET DE

RENSEIGNEMENTS