

SUSPENSION DE NYSTATINE

Autres NOMS : Mycostatin®, Nilstat®, Nyaderm, PMS-Nystatin

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La suspension de nystatine est utilisée pour prévenir et traiter les infections fongiques de la bouche (muguet).

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La nystatine est offerte sous forme de suspension orale à 100 000 unités/mL. La dose la plus couramment utilisée est de **500 000 unités (5 mL ou 1 cuillerée à thé) 4 fois par jour**. Vous devriez vous rincer la bouche avec la suspension et la garder dans la bouche pendant plusieurs minutes avant de l'avaler.

Bien agiter le flacon avant chaque usage pour bien mélanger le médicament.

Votre dose est la suivante :

□ suspension à 100 000 unités/mL

_____ mL (_____ unités)
_____ fois par jour pendant
_____ jours

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de nystatine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement la dose habituelle.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Bien que la nystatine soit relativement bien tolérée, certains effets indésirables, bien que rares, peuvent survenir. Les effets indésirables suivants ont été observés avec la suspension orale de nystatine : nausée, vomissements, diarrhée, malaises d'estomac et douleur à l'estomac.

De rares cas d'irritation de la bouche ont été observés. De plus, des réactions allergiques à ce médicament ont rarement été observées. Si vous avez des rougeurs (éruptions) sur la peau ou des symptômes tels que difficulté à respirer et enflure au visage, consultez immédiatement un médecin.

Si vous êtes inquiet au sujet de ces effets imprévus, veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Vous ne devez rien manger ni boire pendant les 20 minutes suivant la prise de la suspension orale de nystatine dans le but de prolonger la durée du contact avec la surface de la bouche.

Même si les symptômes de votre infection de la bouche s'améliorent

après un à trois jours, continuez de prendre la nystatine pour la durée complète du traitement prescrit par votre médecin. Si vous arrêtez de prendre le traitement avant, il se pourrait que votre infection réapparaisse. Si votre infection dans la bouche s'aggrave ou persiste après la fin de votre traitement, consultez votre médecin pour qu'il puisse réévaluer l'infection.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

La suspension orale de nystatine doit être gardée dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence: Monographie de Mycostatin® (nystatine).
Montréal, Qc, Canada : Bristol-Myers Squibb, 2002.
Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional
Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site :
www.hivclinic.ca

***SUSPENSION
ORALE DE
NYSTATINE***

***FEUILLET DE
RENSEIGNEMENTS***