

PHOSPHATE DE PRIMAQUINE

Autre NOM : Primaquine

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La primaquine est un antibiotique utilisé pour traiter divers types d'infections. Elle peut être administrée en association avec la clindamycine (Dalacin® C) pour le traitement de la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC). Cette association est habituellement utilisée pour les personnes ayant eu des effets indésirables ou une toxicité à des médicaments à base de sulfa, tels que le triméthoprime-sulfaméthoxazole (TMP/SMX, Bactrim®, Septra®) et la dapsons. Cette association est une solution de rechange sûre et efficace.

La primaquine peut aussi être administrée pour le traitement d'infections parasitaires comme la malaria.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La primaquine est offerte sous forme de comprimés à 15 mg. Pour le traitement de la PPC, la dose habituelle recommandée est de 15 à 30 mg, une fois par jour, pendant 21 jours.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 15 mg

comprimé (___mg) une fois par jour

La primaquine peut être prise avec ou sans nourriture. Vous pouvez la prendre avec de

la nourriture pour éviter des troubles d'estomac.

Que faire si vous OUBLIEZ de prendre une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de primaquine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre des doses de primaquine, votre infection peut persister ou s'aggraver, et vous devrez peut-être prendre d'autres médicaments. Il est donc très important de prendre la primaquine durant toute la durée du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La primaquine est généralement bien tolérée, mais peut parfois occasionner les effets suivants : **nausées, vomissements, malaises d'estomac, perte d'appétit et crampes abdominales**. Si ces symptômes se manifestent et sont incommodants, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La primaquine peut occasionner divers effets indésirables au niveau du sang, dont les plus graves sont l'**anémie hémolytique** (décomposition des globules rouges) et la **méthémoglobinémie** (augmentation de la forme d'hémoglobine ne pouvant pas transporter l'oxygène). Ces

effets varient en fonction de la quantité de primaquine prise et du niveau de globules rouges avant le début du traitement.

De rares cas de **leucopénie** (diminution du nombre de globules blancs augmentant votre risque d'infections bactériennes) peuvent aussi survenir.

Dans le but d'éviter ces effets indésirables, il est important que vous veniez pour des tests sanguins régulièrement. Veuillez aviser votre médecin si vous avez les symptômes suivants : **fatigue, faiblesse, essoufflement, battements de cœur rapides, urine foncée, fièvre ou frissons**.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre la primaquine, il est important d'aviser votre médecin si vous avez ou avez déjà eu des allergies à la primaquine, une maladie du sang, le lupus (lupus érythémateux aigu disséminé) ou de l'arthrite (polyarthrite rhumatoïde).

Une carence en glucose-6-phosphate-déshydrogénase ou en NADH-méthémoglobine-réductase peut vous rendre plus susceptible aux maladies sanguines susmentionnées. Communiquez avec votre médecin si vous avez des carences en ces enzymes. Avisez aussi votre médecin si vous avez des parents

proches qui ont des maladies sanguines comme l'anémie hémolytique ou le favisme.

La sécurité de la primaquine durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été établie. De façon générale, vous ne devriez PAS prendre la primaquine si vous êtes enceinte et l'allaitement durant le traitement n'est PAS recommandé. Veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

D'autres médicaments peuvent influencer l'effet de la primaquine et augmenter le risque d'avoir des effets indésirables. De plus, la primaquine peut influencer l'effet d'autres médicaments. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés de primaquine doivent être gardés dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre

pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Primaquine (phosphate de primaquine). Markham, ON, Canada : Sanofi Canada Inc., 1998. Évaluation Drugdex du médicament primaquine. Thompson Micromedex® Health Care Services, Vol 115, 2003. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site www.hivclinic.ca

PHOSPHATE DE PRIMAQUINE

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS