

## PYRAZINAMIDE

**Autre NOM :** Tebrazid<sup>MC</sup>

### **POURQUOI ce médicament est-il prescrit?**

Le pyrazinamide est un antibiotique qui élimine les bactéries qui causent la tuberculose. Il est habituellement utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter la tuberculose. Il peut aussi être administré en association avec un autre médicament pour prévenir la tuberculose chez les patients ayant été en contact avec une personne infectée par la tuberculose.

### **COMMENT ce médicament doit-il être pris?**

Le pyrazinamide est offert sous forme de comprimé blanc à 500 mg, pris habituellement une fois par jour. La dose est déterminée en fonction de votre poids. Votre dose est la suivante :

comprimé à 500 mg

\_\_\_\_comprimé(s)(\_\_\_\_mg)\_\_\_\_fois par jour

Le pyrazinamide peut être pris avec ou sans nourriture.

Le pyrazinamide doit être pris régulièrement pour être efficace et prévenir la résistance au médicament. Prenez toutes les doses prescrites même si vous commencez à vous sentir mieux.

### **Que faire si vous OUBLIEZ de prendre une dose?**

Si vous oubliez de prendre une dose de pyrazinamide, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement la dose habituelle.

### **Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?**

Le pyrazinamide peut parfois causer une douleur articulaire et une enflure dans les articulations, surtout le gros orteil, les chevilles ou les genoux. Si ces effets sont incommodants, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

Le pyrazinamide peut **augmenter les enzymes du foie**, et ce, sans symptômes évidents. De rares cas d'**hépatite** (inflammation du foie) peuvent survenir. Les signes d'hépatite comprennent des yeux et une peau jaunes, une urine foncée, de la fièvre,

des nausées et/ou des vomissements, des selles pâles, une fatigue et une douleur abdominale. Avisez votre médecin si vous avez ces symptômes.

Le pyrazinamide peut rendre votre peau plus **sensible à la lumière du soleil**. Portez des vêtements de protection ou utilisez un écran solaire (FPS minimum de 15) si vous allez à l'extérieur. Évitez d'utiliser des lits de bronzage ou des lampes solaires.

De rares cas de **réaction allergique** avec des symptômes tels que **rougeurs (éruptions) sur la peau, démangeaisons et fièvre** peuvent survenir. Si ces effets se manifestent, communiquez avec votre médecin.

Votre médecin effectuera des tests sanguins régulièrement pour vérifier votre sang, votre taux d'acide urique, ainsi que la fonction de votre foie et de vos reins.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?**

Avant de prendre le pyrazinamide, avisez votre médecin si vous avez déjà

pris ce médicament et si vous avez eu des effets indésirables tels qu'une réaction allergique ou des problèmes de foie.

Avisez également votre médecin si vous avez des antécédents de goutte, de diabète, de maladie des reins ou du foie.

Le pyrazinamide peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non, en particulier la colchicine, l'allopurinol (Zyloprim®), le probénécide (Benuryl<sup>MC</sup>), la sulfapyrazone et la cyclosporine (Neoral®, Sandimmune®). Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il est préférable d'éviter de consommer de l'alcool lorsque vous prenez du pyrazinamide, car votre foie pourrait être plus sensible lorsque vous prenez ce médicament.

La sécurité du pyrazinamide durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été établie. Discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet.

## **Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

Les comprimés de pyrazinamide doivent être gardés dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_  
**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Tebrazid<sup>MC</sup> (pyrazinamide).  
Montréal, Qc, Canada : ICN Canada Ltd., 2001. Préparé  
par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty  
Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur  
les médicaments peuvent être consultés au site :  
[www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***PYRAZINAMIDE***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***