

# RIFAMPINE

**Autres NOMS :** rifampicine, Rifadin®, Rofact<sup>MC</sup>, Rifater® (contient une association fixe de rifampine, isoniazide, et pyrazinamide)

## POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La rifampine est un antibactérien utilisé en association avec d'autres médicaments pour traiter la tuberculose. Elle peut aussi être utilisée pour traiter d'autres sortes d'infections.

## COMMENT ce médicament doit-il être pris?

La rifampine est offerte sous forme de capsules à 150 et 300 mg. Les capsules devraient être avalées en entier une heure avant ou 2 heures après un repas, avec un grand verre d'eau.

La dose habituelle pour les adultes pour le traitement de la tuberculose est de 600 mg une fois par jour. Il se peut que cette dose soit réduite en fonction de votre poids ou si vous avez des problèmes de foie.

Votre dose est la suivante :

- capsule à 150 mg
- capsule à 300 mg

\_\_capsule(s) (\_\_mg) \_\_fois par jour

Les patients ayant de la difficulté à absorber la présentation orale de la rifampine peuvent utiliser la présentation intraveineuse. La présentation intraveineuse de rifampine est un médicament expérimental au Canada.

Pour être efficace et prévenir la résistance, la rifampine doit être prise régulièrement. Prenez toutes les doses prescrites, même si vous commencez à vous sentir mieux.

## Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de rifampine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La rifampine peut parfois causer des **brûlures d'estomac, des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, des crampes d'estomac, des gaz et de la diarrhée**. Même s'il est préférable de prendre la rifampine à jeun, il est possible de soulager les effets gastriques indésirables en la prenant avec une collation. Si ces effets restent incommodes, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

D'autres effets indésirables tels que **maux de tête, somnolence, fatigue, étourdissements, confusion, faiblesse musculaire, douleur et engourdissement dans les bras et les jambes et fièvre** peuvent parfois survenir. Des changements du **cycle menstruel** des femmes (menstruations prolongées, pertes sanguines entre les menstruations, intervalles prolongés entre les menstruations) peuvent aussi survenir. Communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez ces symptômes.

La rifampine peut causer **une décoloration rouge-orange** de l'urine, des selles, de la salive, des crachats, de la sueur, des larmes et de la peau. Cet effet indésirable ne nécessite habituellement pas de soins médicaux. Cependant, si vous portez des verres de contact, il est recommandé que vous portiez des lunettes pour éviter la décoloration de vos verres de contact.

La rifampine peut **augmenter les enzymes du foie**, et ce, sans symptômes évidents. De rares cas d'**hépatite** (inflammation du foie) peuvent survenir. Les signes d'hépatite comprennent des yeux et une peau jaunes, une urine foncée, de la fièvre, des nausées et/ou des vomissements, des selles pâles, une fatigue et une douleur abdominale. Avisez votre médecin si vous avez ces symptômes. Votre médecin effectuera des tests sanguins régulièrement pour vérifier la fonction de votre foie.

Les effets indésirables graves pouvant être causés par la rifampine comprennent une **neutropénie et une leucopénie** (diminution du nombre de globules blancs pouvant augmenter votre risque d'infection bactérienne) ou une **anémie** (diminution du nombre de globules rouges pouvant causer une fatigue et un essoufflement). De rares cas de **thrombocytopénie** (diminution du nombre de plaquettes pouvant favoriser les saignements et les bleus) peuvent survenir. Des tests sanguins seront effectués pour vérifier tout changement de ces valeurs. Avisez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, essoufflement, battements de cœur rapides, fatigue, saignements ou bleus.

De rares cas de réactions allergiques à la rifampine peuvent survenir. Avisez votre médecin si vous avez des rougeurs sur la peau et des démangeaisons.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.**

## Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre la rifampine, avisez votre médecin si vous avez des problèmes de reins ou de foie. Ce médicament peut influencer d'autres médicaments, particulièrement ceux qui sont

éliminés par le foie, dont :

- clarithromycine (Biaxin®)
- delavirdine (Rescriptor®)
- fluconazole (Diflucan<sup>MC</sup>)
- itraconazole (Sporanox®)
- kétoconazole (Nizoral®)
- phénytoïne (Dilantin<sup>MC</sup>)
- inhibiteurs de la protéase
  - amprénavir (Agenerase<sup>MC</sup>)
  - indinavir (Crixivan®)
  - nelfinavir (Viracept®)
  - saquinavir (Invirase®, Fortovase<sup>MC</sup>)
  - ritonavir (Norvir®Sec)
  - lopinavir / ritonavir (Kaletra<sup>MC</sup>)
  - warfarine (Coumadin®)

etc.

De nombreux autres médicaments peuvent influencer l'effet de la rifampine. De plus, la rifampine peut diminuer l'effet d'autres médicaments. Avisez votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

L'efficacité de la pilule contraceptive ou d'autres hormones utilisées pour prévenir la grossesse pourrait être diminuée si vous prenez de la rifampine. Une autre méthode de contraception, comme des condoms, devrait être utilisée.

Afin de limiter les problèmes de foie, vous devriez éviter de consommer de l'alcool pendant que vous prenez la rifampine.

La rifampine ne devrait PAS être utilisée si vous êtes enceinte, sauf si le médecin juge que les bienfaits l'emportent sur les risques. Veuillez discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des craintes à ce sujet. Vous ne devriez PAS allaiter si vous prenez de la rifampine.

### **Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

La rifampine doit être gardée dans un endroit frais (15-30 °C) et sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni dans la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Rifadin® (rifampine). Laval, Qc, Canada : Aventis Pharma Inc., 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

***RIFAMPINE***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***