

TRIMÉTHOPRIME

Autre NOM : Proloprim®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le triméthoprime est un antibiotique utilisé en association avec le dapsoné (Avlosulfon®) pour traiter la pneumonie à *Pneumocystis carinii* (PPC). Il est utilisé aussi pour traiter divers types d'infections bactériennes.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le triméthoprime est offert en comprimés à 100 et 200 mg.

La dose habituelle de triméthoprime pour le traitement de la PPC est déterminée selon votre poids. La dose doit être ajustée si vous avez des problèmes aux reins. Habituellement, la dose est administrée 3 ou 4 fois par jour.

Le triméthoprime peut être pris avec ou sans nourriture. S'il cause des malaises à l'estomac, prenez-le avec de la nourriture.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 100 mg

comprimé à 200 mg

___comprimé (___mg) ___fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de triméthoprime, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre votre triméthoprime, votre infection peut continuer ou s'aggraver. Dans un tel cas, vous devrez peut-être prendre d'autres médicaments. Par conséquent, il est extrêmement important de prendre le triméthoprime pendant toute la durée du traitement.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Le triméthoprime peut causer une **éruption cutanée (plaques rouges sur la peau), des démangeaisons** et une **sensibilité accrue de la peau au soleil**. Consultez un médecin immédiatement si vous avez une éruption cutanée.

Une **diminution des globules blancs** (nécessaires pour combattre les infections), des **globules rouges** (nécessaires au transport de l'oxygène dans l'organisme), et des **plaquettes** (nécessaires à la coagulation du sang) peut se produire. Habituellement, ces diminutions ne sont pas assez importantes pour arrêter votre traitement. Il est important de vous présenter à vos rendez-vous pour vos prises de sang régulières pour que votre médecin puisse surveiller ces valeurs. Veuillez aviser votre médecin si vous avez des symptômes tels que fièvre, frissons, essoufflement, battements de cœur rapides, fatigue, saignements ou bleus.

Les **nausées**, les **vomissements** et les **crampes abdominales** ne sont pas fréquentes. Si ces effets se produisent, prenez le médicament avec de la nourriture. Si les problèmes persistent, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien. Une **stomatite** (inflammation et ulcérations dans la bouche), **maux de tête, douleur articulaire, fatigue** et **faiblesse musculaire** peuvent également se produire.

Le triméthoprime peut entraîner des **augmentations des enzymes du foie, de la bilirubine et des taux de potassium**. Ces augmentations seront surveillées lors de vos tests de laboratoire.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Avant de commencer à prendre le triméthoprime, n'oubliez pas de mentionner à votre médecin et votre pharmacien si vous avez déjà eu une réaction allergique au triméthoprime ou au co-trimoxazole (Septra®, Bactrim®). Également, avisez votre médecin si vous avez des problèmes aux reins ou au foie.

Le triméthoprime peut rendre votre peau plus sensible au soleil ou aux lampes solaires. Par conséquent, portez des vêtements protecteurs et utilisez un écran solaire ayant au moins un FPS de 15 lorsque vous vous exposez au soleil. Vous devriez éviter les lampes solaires. Demandez à votre pharmacien de vous aider à choisir un écran solaire qui

protège contre les réactions médicamenteuses associées au soleil.

Le triméthoprimé peut entraver l'action de plusieurs médicaments. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Veuillez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez les médicaments suivants :

- Méthotrexate
- Phénytoïne (Dilantin^{MC})
- Procaïnamide (Pronestyl®)
- Pyriméthamine (Daraprim®)
- Zidovudine (Retrovir®)

Le triméthoprimé ne doit PAS être administré si vous êtes enceinte. Il faut également éviter d'allaiter si vous prenez le triméthoprimé. En général, l'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infecté par le VIH car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

Les comprimés de triméthoprimé devraient être entreposés dans un endroit frais et sec (15-30 °C) à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder dans la salle de bains ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____

Téléphone: _____

Référence : Monographie de Proloprim® (triméthoprimé). Saint-Laurent, QC, Canada : GlaxoSmithKline, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.hivclinic.ca

TRIMÉTHOPRIME

FEUILLET

DE

RENSEIGNEMENTS