

# VORICONAZOLE

Autre NOM : Vfend®

## POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

Le voriconazole est un agent antifongique. Il est utilisé pour traiter une variété d'infections fongiques (candida, aspergillose) dans la bouche (comme le muguet), l'œsophage, les poumons, le sang et dans d'autres organes.

## COMMENT ce médicament doit-il être pris?

Le voriconazole est présenté en comprimés à 50 mg et 200 mg. Au cours des premiers jours de traitement, il peut également être administré par injection intraveineuse (dans les veines). Les injections intraveineuses peuvent être administrées sur 1 à 2 heures, probablement par une infirmière à la clinique.

La dose de voriconazole est fonction de votre poids et des autres médicaments que vous prenez. La dose orale habituelle est de 200 mg deux fois par jour. Votre médecin devra peut-être ajuster cette dose selon vos besoins.

Les comprimés de voriconazole doivent être pris à jeun. Veuillez prendre votre dose au moins 1 heure avant un repas ou 2 heures après.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 50 mg

comprimé à 200 mg

\_\_\_\_\_ comprimés (\_\_\_\_\_mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

ou

perfusion intraveineuse

\_\_\_\_\_ mL (\_\_\_\_\_mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

Veillez prendre le voriconazole pour la période de temps prescrite. Si vous arrêtez trop tôt, votre infection peut revenir. Si l'infection s'aggrave ou persiste, consultez votre médecin.

## Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de voriconazole, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

Le voriconazole peut provoquer des **maaises d'estomac, des nausées, des vomissements et une perte d'appétit**. D'autres effets indésirables possibles sont : **douleur abdominale, diarrhée et maux de tête**. Si ces effets se produisent, veuillez en aviser votre médecin ou votre pharmacien.

Le voriconazole peut **augmenter les enzymes du foie**, ce qui se produit sans symptôme. Rarement, une hépatite (inflammation du foie) peut se produire. Les signes d'une hépatite sont : jaunissement des yeux et de la peau, fièvre, nausées et/ou vomissements graves, urine foncée, selles pâles, fatigue et douleur abdominale. Consultez un médecin immédiatement si vous ressentez ces symptômes. Votre médecin vous fera passer des tests sanguins régulièrement pour vérifier la fonction de votre foie.

Rarement, certaines personnes peuvent avoir une réaction allergique au voriconazole. Si vous êtes allergique au médicament, vous pouvez avoir **une éruption cutanée (plaques rouges sur la peau), de l'urticaire, des démangeaisons, de l'enflure ou une sensation de chatouillement dans la bouche ou la gorge, des douleurs à la poitrine et des problèmes respiratoires**. Veuillez consulter

un médecin immédiatement si ces symptômes se manifestent.

Des changements visuels peuvent aussi se produire si vous recevez le voriconazole. Ces changements sont : changements de la vision des couleurs et vision trouble. Ces symptômes sont habituellement légers et temporaires. Si vous remarquez des changements dans votre vision, vous devriez éviter de conduire, d'utiliser de la machinerie ou d'accomplir toute activité qui peut être dangereuse si votre vision est réduite. Avisez votre médecin si votre vision est modifiée ou si les lumières éclatantes vous incommode.

## Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament ?

Avant de commencer à prendre le voriconazole, mentionnez à votre médecin si vous avez déjà eu une allergie au voriconazole ou à des médicaments semblables [kétocoazole (Nizoral®), fluconazole (Diflucan®), itraconazole (Sporanox®)]. N'oubliez pas de mentionner à votre médecin si vous avez des problèmes aux reins, au foie ou avec votre vision.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet du voriconazole. Le voriconazole peut influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Vous ne devez PAS prendre les médicaments suivants si votre médecin vous a prescrit le voriconazole :

- Astémizole (Hismanal®)
- Carbamazépine (Tegretol®)
- Cisapride (Prepulsid®)

- Dérivés de l'ergot [ergotamine (Cafergot®, Bellergal®, Ergodryl<sup>MC</sup>, Gravergol®), ergonovine, dihydroergotamine (Migranal®), méthylelrgonovine (Methergine®)]
- Phénobarbital
- Pimozide (Orap®)
- Quinidine (Biquin Durules®)
- Rifabutine (Mycobutin®)
- Rifampine (p. ex., Rifadin®, Rimactane®, Rofact<sup>MC</sup>)
- Sirolimus (Rapamune®)
- Terfénadine (Seldane®)

Le voriconazole peut rendre votre peau plus sensible au soleil ou aux lampes solaires. Par conséquent, portez des vêtements protecteurs et utilisez un écran solaire ayant au moins un FPS de 15 lorsque vous vous exposez au soleil. Vous devriez éviter les lampes solaires. Demandez à votre pharmacien de vous aider à choisir un écran solaire qui protège contre les réactions médicamenteuses associées au soleil.

La sécurité du voriconazole durant la grossesse ou l'allaitement n'a pas été établie. Vous devriez éviter de devenir enceinte en utilisant des méthodes contraceptives appropriées lorsque vous prenez le voriconazole. Il n'est PAS recommandé d'allaiter lorsque vous prenez le voriconazole. Veuillez en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des préoccupations à ce sujet.

**Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

Le voriconazole devrait être entreposé à la température de la pièce (15-30 °C) dans un endroit sec protégé de la lumière et hors de la portée des enfants. La solution diluée de voriconazole pour l'administration intraveineuse devrait être gardée au réfrigérateur entre 2 à 8°C et utilisée en moins de 24 heures.

Si vous recevez la solution intraveineuse à la maison, sortez le sac du réfrigérateur environ

une heure avant votre traitement et laissez-le réchauffer à la température de la pièce. Vérifiez votre sac pour qu'il n'y ait pas de fuites ni de particules solides dans la solution. Si c'est le cas, vous ne devez pas utiliser le sac.

S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder dans la salle de bain ni près de la cuisinière, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_  
**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence: Drugdex drug evaluations Voriconazole. Thompson Micromedex® Health Care Services, Vol 115, 2003. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.hivclinic.ca](http://www.hivclinic.ca)

# ***VORICONAZOLE***

## ***FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS***